ملخص الدوال كثيرات الحدود

1. الدالة كثير حدود

نسمي دالة كثير حدود (أو كثير حدود) كل دالة P معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$$

حيث n عدد طبيعي و $a_n;a_{n-1};.....;a_1;a_0$ أعداد حقيقية ثابتة.

2. درجة كثير حدود

كل دالة كثير حدود غير معدومة P تكتب بطريقة وحيدة على الشكل:

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0 \quad \text{حيث} \quad a_n\neq 0$$

يسمى العدد الطبيعي n درجة كثير الحدود P ، تسمى الأعداد $a_n;a_{n-1};.....;a_1;a_0$ معاملاته

3. تساوي كثيري حدود

- يكون كثير حدود معدوما إذا وفقط إذا كانت كل معاملاته معدومة.
- يكون كثيرا حدود، غير معدومين، متساويين إذا وفقط إذا كانا من نفس الدرجة وكانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية.

4. جذر كثير حدود

P كثير حدود درجته أكبر من أو تساوي 1 و α عدد حقيقي.

α جذر لكثير الحدود P يعني أن $P(\alpha)=0$.

5. تحليل كثير حدود باستعمال العامل $(x-\alpha)$

ليكن P كثير حدود درجته أكبر من أو تساوي 1 و α عدد حقيقي.

إذا كان $P(\alpha)=0$ (α جذر لكثير الحدود P) فإنه يوجد كثير حدود Q بحيث من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $P(x)=(x-\alpha)P(x)$

تمرين تطبيقي: P دالة كثير حدود معرفة بـ: $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

☑ تحقق أن العدد 2 جذر لكثير الحدود P

☑ عين كثير حدود Q بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x)=(x-2)Q(x)$

طريقة: لتعيين $Q(x)$ نضع $Q(x)=ax^2+bx+c$ ثم نعيين المعاملات $a;b$ و c باستعمال تساوي كثيري حدود (طريقة المطابقة) وذلك بعد نشر وتبسيط وترتيب العبارة $(x-2)(ax^2+bx+c)$ كما

1. طريقة المطابقة:

لدينا $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

ولدينا أيضا العدد 2 جذر لكثير الحدود P

نضع $P(x)=(x-2)(ax^2+bx+c)$

ومنه $P(x)=ax^3+bx^2+cx-2ax^2-2bx-2c$

وبالتالي $P(x)=ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x : $ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c=x^3-x^2-4x+4$

وهذا يعني $\begin{cases}a=1\\b-2a=-1\\c-2b=-4\\-2c=4\end{cases}$ أي $\begin{cases}a=1\\b=2a-1=2(1)-1=1\\c=-2\end{cases}$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x : $P(x)=(x-2)(x^2+x-2)$

2. طريقة القسمة الإقليدية:

لدينا $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

ولدينا أيضا

العدد 2 جذر لكثير الحدود P

$$\begin{array}{r|l} x^3-x^2-4x+4 & x-2 \\ \hline -\,(x^3-2x^2) & x^2+x-2 \\ \hline x^2-4x+4 & \\ -\,(x^2-2x) & \\ \hline -2x+4 & \\ -\,(-2x+4) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

إذن من أجل كل عدد حقيقي x : $P(x)=(x-2)(x^2+x-2)$

3. خوارزمية هورنر (Horner)

لدينا $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

ولدينا أيضا العدد 2 جذر لكثير الحدود P

	1	−1	−4	4
2	0	2	2	−4
	1	1	−2	0

إذن من أجل كل عدد حقيقي x : $P(x)=(x-2)(x^2+x-2)$

المعادلات من الدرجة الثانية

1. المعادلة من الدرجة الثانية

نسمي معادلة من الدرجة الثانية، ذات المجهول x ، كل معادلة من الشكل: $ax^2+bx+c=0$
حيث a ; b و c أعداد حقيقية ثابتة مع $a\neq 0$

2. حل المعادلة: $ax^2+bx+c=0$ حيث $(a\neq 0)$

إذا كان:	حلول المعادلة $ax^2+bx+c=0$ هي:	تحليل ax^2+bx+c على الشكل:	إشارة ax^2+bx+c
$\Delta>0$	$x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$	$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$	
$\Delta=0$	$x_0=\dfrac{-b}{2a}$	$ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2$	
$\Delta<0$	لا توجد حلول في $\mathbb{R}$	ax^2+bx+c لا يمكن تحليل	

N.B: إذا كان $\Delta=0$ نقول أن المعادلة ax^2+bx+c تقبل حلا مضاعفا.

طريقة: لحل متراجحة من الشكل $ax^2+bx+c\geq 0$; $ax^2+bx+c>0$; $ax^2+bx+c\leq 0$ أو $ax^2+bx+c<0$ ندراسة إشارة حدود الحدود ax^2+bx+c ثم نستنتج الحلول.

مجموع و جداء حلي معادلة من الدرجة الثانية

نعتبر المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي x : $ax^2+bx+c=0\ldots(1)$ حيث $(a\neq 0)$

إذا كان $\Delta\geq 0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين (جذرين) x_1 و x_2 حيث:

$$\begin{cases} x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

فإن: $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ و $x_1\times x_2=\dfrac{c}{a}$

تعيين إشارة حلي معادلة من الدرجة الثانية

نعتبر المعادلة: $(1).....ax^2+bx+c=0$ حيث $(a\neq 0)$.

1. إذا كان $\frac{c}{a}<0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين إشارتاهما مختلفتان.
2. إذا كان $\frac{c}{a}>0$; $\Delta>0$ و $-\frac{b}{a}>0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين موجبين تماما.
3. إذا كان $\frac{c}{a}>0$; $\Delta>0$ و $-\frac{b}{a}<0$ فإن المعادلة (1) تقبل حلين سالبين تماما.

المعادلات مضاعفة التربيع

معادلة مضاعفة التربيع، ذات المجهول x ، كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل:
$ax^4+bx^2+c=0$ حيث $a;b$ و c أعداد حقيقية ثابتة مع $a\neq 0$

طريقة: حل المعادلة $ax^4+bx^2+c=0$ يؤول إلى حل الجملة: $\begin{cases} X=x^2 \\ aX^2+bX+c=0 \end{cases}$

يسمى المجهول X مجهولا مساعدا.

بعد حل المعادلة $aX^2+bX+c=0$ نستنتج حلول المعادلة $ax^4+bx^2+c=0$

كم الله خيرا

جارية