الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديريـة التربية لولاية بسكرة **الثانويات : محمد بوجمعة لوطاية - محمد خيرالدين**

امتحان البكالوريا التجريبي **مكي مني- العربي بن مهيدي**

الشعبة : آداب وفلسفة , لغات أجنبية **يوم: الاثنين 12 مـــــاي 2025**

اختبار في مادة : الرياضيات المـدة : 02 سا و30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول:

التمرين الأول: (06ن)

نعتبر المتتالية الحسابية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_{11}=42$ و $u_{15}=54$

1) بين أن أساس المتتالية (U_n) هو $r=3$ ، ثم أحسب حدها الأول U_0 .
2) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n
3) أحسب الحد الثامن للمتتالية (u_n)
4) بين أن العدد 2025 هو حد من حدود المتتالية (u_n) . عين رتبته
5) أحسب المجموع بدلالة n حيث : $S_n=u_0+u_1+...+u_n$
6) عين العدد الطبيعي n حيث : $S_n=156$

التمرين الثاني: (06ن)

لتكن a ، b و c أعداد طبيعية حيث: $c=2024$ ، $b=2025$ ، $a\equiv 1446$.

1) عين باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد a ، b و c على 5 .
2) استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد $a+b+c$ ، $a\times b+c$ و $2a+b^2$ على 5 .
3) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $c^{2n}\equiv 1[5]$.
4) بين أن $c^{2026}-1$ يقبل القسمة على 5 .
5) عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $c^{2026}-1+n\equiv 0[5]$.

التمرين الثالث: (08ن)

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x^3-3x-2$

(C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) أحسب نهايتي الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$.
2) أحسب $f'(x)$ ثم أدرس إشارتها .
3) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها
4) أ) تحقق من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x)=(x+1)(x^2-x-2)$

ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$ ثم استنتج نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل

5) أ) بين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيينها

ب) أكتب مـ

الموضوع الثاني:

التمرين الأول: (06ن)

(u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ :

$$\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

1) أحسب u_1 و u_2

2) نعرف المتتالية (v_n) على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n - 3$

أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول

ب) أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n

3) نضع $S_n = v_0 + v_1 + ... + v_n$ و $S_n' = u_0 + u_1 + ... + u_n$

أحسب S_n بدلالة n ثم استنتج S_n'

التمرين الثاني: (06ن)

ليكن a و b عددان طبيعيان حيث : $a = 2026$، $b \equiv -21[5]$

1) عين باقي القسمة الإقليدية لكل من a و b على 5

2) اثبت ان العدد $b^3 + 7a - 1$ يقبل القسمة على 5

3) أ) بين أن $3^4 \equiv 1[5]$.

ب)استنتج انه من اجل كل عدد طبيعي k : $3^{4k} \equiv 1[5]$، $3^{4k+1} \equiv 3[5]$ ، $3^{4k+2} \equiv 4[5]$ ، $3^{4k+3} \equiv 2[5]$.

4) استنتج باقي قسمة العدد $1963^{1830} + 3^{1954} - 4$ على 5 .

التمرين الثالث: (08ن)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ : $f(x) = \dfrac{2x-5}{x+2}$

(C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

1) تحقق أنه لكل x من $\mathbb{R} - \{-2\}$: $f(x) = 2 - \dfrac{9}{x+2}$

2) أ) احسب النهايات التالية : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{<}-2} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\xrightarrow{>}-2} f(x)$

ب) استنتج معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) .

3) أ) احسب $f'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

ب) شكل جدول تغيرات الدالة f

4) عين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي محوري الإحداثيات .

5) اكتب معادلة لـ (Δ) مماس المنحنى (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 .

6) أنشئ (Δ) و (C_f) .

انتهى الموضوع الثاني

تصحيح نموذجي لإختبار البكالوريا التجريبي(الموضوع1) :

تصحيح التمرين الأول:

1) إيجاد الأساس r :

لدينا $u_{11}=42$ و $u_{15}=54$

ونعلم أن $u_n=u_p+(n-p)r$ ومنه $r=\dfrac{u_n-u_p}{n-p}$

أي $r=\dfrac{u_{12}-u_{11}}{15-11}=\dfrac{54-42}{4}$ ومنه $r=3$.

حساب u_0 : لدينا $u_n=u_0+nr$ ومنه $u_{11}=u_0+11r$

إذن $42=u_0+33$ ومنه $u_0=9$.

2) عبارة u_n بدلالة n :

لدينا $u_n=u_0+nr$ ومنه $u_n=9+3n$

3) حساب الحد الثامن للمتتالية (u_n) :

الحد الثامن للمتتالية (u_n) هو u_7

ولدينا $u_n=u_0+nr$ أي $u_7=9+7\times3$ وبالتالي: $u_7=30$

4) اثبات أن 2025 حد من حدود (u_n) :

نحل المعادلة $u_n=2025$ أي $9+3n=2025$

ومنه $3n=2016$ وبالتالي : $n=672$. ومنه 2025

هو حد من حدود (u_n) بحيث $u_{672}=2025$.

رتبته هي 673 .

5) حساب S_n : $S_n=u_0+u_1+...+u_n$

عدد الحدود : n-0+1=n+1 اذن:

$$S_n=\frac{n+1}{2}(u_0+u_n)=\frac{n+1}{2}(9+9+3n)$$

$$=\frac{1}{2}(n+1)(3n+18)$$

6) إيجاد العدد الطبيعي n حيث $S_n=156$:

لدينا $S_n=156$ معناه $\dfrac{1}{2}(n+1)(3n+18)=156$

بالضرب في 2 نجد : $(n+1)(3n+18)=312$ معناه

$3n^2+18n+3n+18-312=0$ معناه $3n^2+21n-294=0$

ومنه $\Delta=21^2-4(3)(-294)=3969=63^2$

للمعادلة حلين هـ

$n_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\dfrac{-21+63}{6}=7$ وهو مقبول أي $n=7$.

تصحيح التمرين الثاني:

1) باقي القسمة الإقليدية لـ a ، b و c على 5 :

لدينا $a=1446=5\times289+1$ اذن $a\equiv1[5]$

ولدينا $b=2025=5\times405$ اذن $b\equiv0[5]$

ولدينا $c=2024=5\times404+4$ اذن $c\equiv4[5]$

2) استنتاج باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد:

- $a+b+c$ على 5:

لدينا $\begin{cases}a\equiv1[5]\\b\equiv0[5]\\c\equiv4[5]\end{cases}$ ومنه $a+b+c\equiv5[5]$ وعليه

$$a+b+c\equiv0[5]$$

- $a\times b+c$ على 5 :

لدينا $\begin{cases}a\equiv1[5]\\b\equiv0[5]\\c\equiv4[5]\end{cases}$ ومنه $abc\equiv0[5]$

- $2a+b^2$ على 5 :

لدينا $\begin{cases}a\equiv1[5]\\b\equiv0[5]\end{cases}$ ومنه $\begin{cases}2a\equiv2[5]\\b^2\equiv0[5]\end{cases}$

وعليه $2a+b^2\equiv2[5]$

3) التحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $c^{2n}\equiv1[5]$:

لدينا $c\equiv4[5]$ ومنه $c\equiv-1[5]$ وبالتالي $c^2\equiv(-1)^2[5]$

وعليه $c^2\equiv1[5]$ ومنه من أجل كل عدد طبيعي n فان :

$(c^2)^n\equiv1^n[5]$ وبالتالي : $c^{2n}\equiv1[5]$ وهو المطلوب .

4) تبيين أن $c^{2026}-1$ يقبل القسمة على 5 :

لدينا $2026=2(2013)$ ومنه $c^{2026}\equiv1[5]$ وعليه

$c^{2026}-1\equiv1-1[5]$ ومنه $c^{2026}-1\equiv0[5]$

ومنه فإن العدد $c^{2026}-1$ يقبل القسمة على 5 .

5) قيم العدد الطبيعي n حتى يكون $c^{2026}-1+n\equiv0[5]$

$c^{2026}-1+n$

www.dzexc

تصحيح التمرين الثالث :

1) حساب $\lim_{x\to\pm\infty} f(x)$:

$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty} x^3=+\infty$ ، $\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty} x^3=-\infty$

2) f' : الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا :

$f'(x)=3x^2-3=3(x^2-1)=3(x-1)(x+1)$

دراسة إشارة $f'(x)$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3) استنتاج اتجاه تغير f :

f متزايدة تماما على كل من المجالين $]-\infty;-1]$ و $[1;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[-1;1]$.

جدول التغيرات :

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	-4	↗	$+\infty$

4) أ) التحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$f(x)=(x+1)(x^2-x-2)$ يكفي النشر والتبسيط .

ب) نحل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$:

$f(x)=0$ معناه $(x+1)(x^2-x-2)=0$ معناه

$x+1=0$ أي $x=-1$ أو $x^2-x-2=0$

$\Delta=(-1)^2-4(1)(-2)=9$ ومنه للمعادلة

$x^2-x-2=0$ حلين هما $x_1=\dfrac{-(-1)-3}{2}=-1$ ،

$x_2=\dfrac{-(-1)+3}{2}=2$.

نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل هناك نقطتان:

أي $(C_f)\cap(xx')=\{(-1;0),(2;0)\}$.

5) أ) اثبات أن المنحني (C_f) يقبل نقطة إنعطاف وتعيينها :

f' قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ولدينا : $f''(x)=6x$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

اذن المشتقة الثانية

ب) كتابة معادلة للمماس (Δ) لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0 وهي $\omega(0;-2)$:

$(\Delta): y=f'(a)(x-a)+f(a)$

ومنه $(\Delta): y=f'(0)(x-0)+f(0)$ ومنه

$(\Delta): y=-3x-2$

6) انشاء (C_f) و (Δ) :



www.dze