

التحضير الجيد للبكالوريا

الشعب:

علوم تجريبية | رياضيات | تقني رياضي | تسيير وإقتصاد

مسائل شاملة

حول الدوال الأسية

إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

1
المسائل الشاملة

- المسألة الشاملة رقم 01
- المسألة الشاملة رقم 02
- المسألة الشاملة رقم 03
- المسألة الشاملة رقم 04
- المسألة الشاملة رقم 05
- المسألة الشاملة رقم 06
- المسألة الشاملة رقم 07
- المسألة الشاملة رقم 08
- المسألة الشاملة رقم 09
- المسألة الشاملة رقم 10
- المسألة الشاملة رقم 11
- المسألة الشاملة رقم 12

◄ بالتوفيق في شهادة البكالوريا ►

01 المسألة الشاملة رقم:

مشاهدة الحل

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = x - e^{-x}$$

1) ادرس تغيرات الدالة g .

2) أ/ بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث: $0.5 < \alpha < 0.6$.

ب/ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x+1}{e^x+1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(o;\vec{i};\vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$.

2) أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{-e^x g(x)}{(e^x+1)^2}$$

ب/ عيّن دون حساب: $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$ فسر النتيجة هندسيا.

3) شكل جدول تغيرات الدالة f.

4) بين أن $f(x) = x$ إذا وفقط إذا كان $g(x) = 0$ ، ثم استنتج قيمة $f(\alpha)$.

5) مثل بيانيا (C_f) .

(III) نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$h(x) = |f(x)|$$

ونسمي (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1) اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

2) انطلاقا من (C_f) ، مثل بيانيا (C_h)

02 المسـألة الشامـــلة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

(I) نعتبر f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = x + 2 - \frac{4e^x}{e^x + 3}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$.

1) احسب $\lim\limits_{x \to +\infty}[f(x)]$ و $\lim\limits_{x \to -\infty}[f(x)]$.

2) بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x - 3}{e^x + 3}\right)^2$$

3) أ/ ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

ب/ عيّن $f''(\ln 3)$ دون حساب عبارة $f''(x)$ – برر اجابتك.

4) أ/ بيّن أنّ المستقيم (Δ_1) ذو المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $-\infty$.

ب/ بيّن أنّ المستقيم (Δ_2) ذو المعادلة $y = x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$.

5) ادرس الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) .

6) اكتب معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .

7) بيّن أن النقطة $A(\ln 3\ ;\ln 3)$ مركز تناظر للمنحني (C_f) .

8) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-2; -1[$ ، ثم عين حصرا للعدد α سعته 10^{-2} .

9) مثّل بيانيا كلا من: (Δ_1) ، (Δ_1) ،

10) ناقش بيانيا حسب القيم الوسيط الحقيقي غير المعدوم m المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية:

$$f(-|x|) = \ln(|m|)x + 2$$

(II) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = f(3x - 2)$$

(عبارة $g(x)$ غير مطلوبة).

1) ادرس تغيرات الدالة g .

2) تحقق من أنّ:

$$g\left(\frac{\alpha + 2}{3}\right) = 0$$

ثم بيّن أنّ:

$$g'\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) = 3f'(\alpha)$$

3) استنتج معادلة المماس (d) لمنحني الدالة g عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+2}{3}$.

4) تحقق من أن معادلة المستقيم (d) تعطى بـ:

$$y = \frac{3\alpha^2}{4}x - \frac{\alpha^2(\alpha+2)}{4}$$


03 المسـألة الشامـــلة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

(I) a ، b و c أعداد حقيقة، نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = (ax + b)e^x + c$$

ونسمي (C_g) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(o; \vec{i}; \vec{j})$. كما في الشكل أدناه:



1) بقراءة بيانية، أوجد ما يلي:

أ/ $\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)]$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]$.

ب/ $g(0)$ و $g'(0)$.

2) مما سبق أوجد a ، b و c.

3) نضع: $g(x) = (x-1)e^x - 1$.

أ/ بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على $\mathbb{R}$ ، ثم تحقق من أن: $1.2 < \alpha < 1.3$.

ب/ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x}{\quad}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في المستو السابق.

1) أ/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$ ثم فسّر النتيجة هندسيا .

ب/ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$.

2) أ/ بيّن أنّه من اجل كل x حقيقي:

$$f'(x)=-\frac{g(x)}{(e^x+1)^2}$$

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها .

3) عيّن دون حساب:

$$\lim_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$$

ثم فسّر النتيجة هندسيا.

4) بيّن أنّ المنحني (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يمر من المبدأ، يُطلب كتابة معادلة له.

5) بيّن أنّ $f(\alpha)=\alpha-1$ ، ثم اوجد حصرا لـ $f(\alpha)$ بتقريب 10^{-2} .

6) أ/ بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

7) مثّل بيانيا المماس (T) والمستقيم (Δ) ثم المنحني (C_f) .

8) m وسيط حقيقي. ناقش بيانيا حسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة $f(x)=m$

04 المسألة الشاملة رقم:

مشاهدة الحل

(I) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1) أ/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$$

ب/ ادرس إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$ ، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحني (C_f) ؟

ج/ شكل جدول تغيرات الدالة f .

2) برهن أنّ النقطة $A(0; 1)$ مركز تناظر المنحني (C_f) .

3) أ/ بيّن أنّ $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - x]$ ماذا تستنتج بالنسبة للمنحني (C_f) ؟

4) بيّن أنّ المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث:

$-2.77 < \alpha < -2.76$.

5) مثّل بيانيا (C_f) .

(II) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = f(4x + 1)$$

(عبارة g غير مطلوبة).

1) ما هو اتجاه تغير الدالة g .

2) تحقق من أنّ:

$$g\left(\frac{\alpha - 1}{4}\right) = 0$$

ثم بيّن أن:

$$g'\left(\frac{\alpha - 1}{4}\right) = 4f'(\alpha)$$

3) استنتج معادلة المماس (T) لمنحني الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha-1}{4}$.

4) تحقق من أن معادلة المماس (T) تعطى بـ:

$$y = (1+\alpha)^2 x - \frac{(1+\alpha)(\alpha^2-1)}{4}$$

(III) نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$k(x) = f(|x|)$$

ونسمي (C_k) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$

1) بيّن أن الدالة k زوجية .

2) أ/ بيّن كيف تمثيل (C_k) انطلاقا من (C_f) .

ب/ انطلاقا من (C_f) ، مثل بيانيا (C_k) .

(IV) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$h(x) = x + \frac{4}{e^x + 1}$$

ونسمي (C_h) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1) تحقق من أنه كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) + 1$.

2) أ/ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يُطلب تعيينه.

ب/ انطلاقا من (C_f) ، مثل بيانيا (C_h)

05 المسـألة الشامـــلة رقم:

مشاهـــدة الحـــل

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = x + 2 - e^x$$

1) ادرس تغيرات الدالة g .

2) بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلان α و β حيث: $1.14 < \alpha < 1.15$ و $-1.9 < \beta < -1.8$.

3) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{e^x - 1}{xe^x + 1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

1) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$. ثم فسر ذلك هندسيا.

2) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x + 1)^2}$$

3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكل جدول تغيراتها.

4) عيّن دون حساب كل من : $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$ وَ $\lim\limits_{x\to\beta}\left[\frac{f(x)-f(\beta)}{x-\beta}\right]$

ثم فسّر النتيجتين هندسيا.

5) بيّن أن: $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha+1}$ ، ثم أوجد حصرا لـ $f(\alpha)$ سعته 10^{-1} .

6) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$h(x) = e^x - xe^x - 1$$

- بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) \leq 0$.

7) نضع من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$p(x) = (x^2 + 1)e^{2x} + xe^x - 2e^x + 1$$

- تحقق من أنّ: $p(0) = 0$.

8) أ/ بيّن أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) عمودي على المستقيم ذو المعادلة $y = -x + 5$.

ب/ اكتب معادلة للمماس (T) .

ج/ ادرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمماس (T) ، ماذا تستنتج بالنسبة للمنحني (C_f) ؟

9) نأخذ: $f(\beta) \cong -1.195$.

مثّل بيانيا المستقيم (T) والمنحني (C_f) .

10) m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم m عدد حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية:

$$e^x(1 - mx^2) + mx - 1 = 0$$

المسألة الشاملة رقم: 06

مشاهدة الحل

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$

1) ادرس تغيرات الدالة f' .

2) احسب $f'(1)$ ثم استنتج إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

3) ادرس تغيرات الدالة f .

4) أ/ بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.

ب/ ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

5) أ/ بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ) في نقطة يُطلب تعيين إحداثييها.

ب/ بين أن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما α و β حيث:

$1.9 < \alpha < 2$ و $-0.5 < \beta < -0.6$.

6) مثل بيانيا: (Δ) ، (T) و المنحني (C_f) .

7) نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي x والوسيط الحقيقي الموجب تماما m التالية:

$$f(x) = 2x + \ln m \ldots (E)$$

- ناقش بيانيا حسب قيم m عدد وإشارة حلول المعادلة (E) .

المسألة الشاملة رقم: 07

مشاهدة الحل

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:

$$g(x) = (2x+1)e^x - 1$$

1) ادرس تغيرات الدالة g' :

2) احسب $g(0)$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = x(e^x - 1)^2$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1) احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2) أ/ بيّن أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحي (C_f) عند $-\infty$.

ب/ ادرس الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (Δ) .

3) أ/ بيّن أنه يوجد من أجل كل عدد حقيقي x لدينا:

$$f'(x) = (e^x - 1)g(x)$$

ب/ استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

4) اكتب معادلة ديكارتية للمماس (T) للمنحني (C_f) عند المبدأ.

5) مثّل بيانيا كلا من (T) ، (Δ) و (C_f) .

6) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد واشارة حلول المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x :

$$(E): f(x) = mx$$

المسألة الشاملة رقم: 08

مشاهدة الحل

نعرف الدالة f على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{2}{e^x + 1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1) أ/ بين أنه من اجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$\frac{1}{e^{-x} + 1} = 1 - \frac{1}{e^x + 1}$$

ب/ استنتج أن الدالة f فردية.

2) احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

3) أ/ بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = -\frac{1}{2}\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$$

ثم ادرس إشارة $f'(x)$.

ب/ ماذا تستنتج بالنسبة لـ (C_f) ؟

ج/ شكل جدول تغيرات الدالة f .

4) أ/ بين أن : $\lim_{x \to +\infty} \left[f(x) + \frac{1}{2}x - 1\right] 0$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ احسب $\lim_{x \to -\infty} \left[f(x) + \frac{1}{2}x + 1\right]$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

5) ادرس الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (d) ذو المعادلة: $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

6) مثل بيانيا (C_f) .

المسألة الشاملة رقم: 09

مشاهدة الحل

نعتبر الدالة f المعرفة $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = -x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2} - 4)$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1) بيّن أنّ $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = -\infty$.

2) أ/ بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + \frac{5}{2}$ مقارب مائل للمنحني (C_f) .

ب/ حل المعادلة : $e^{x-2} - 4 = 0$ ، ثم بيّن أنّ المنحني (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) على المجال $]-\infty; 2 + \ln 4]$ وتحته على المجال $[2 + \ln 4 ; +\infty[$

3) أ/ بيّن أنّه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = -(e^{x-2} - 1)^2$$

ب/ شكل جدول تغيرات الدالة f .

4) احسب $f''(x)$ ، ثم بين أن $A(2; 2)$ نقطة انعطاف للمنحني (C_f) .

5) اثبت أنّ المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$.

6) مثّل بيانيا (Δ) والمنحني (C_f) .

المسألة الشاملة رقم: 10

مشاهدة الحل

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$g(x) = e^x + x + 2$$

1) ادرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$.

2) أ/ بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$ ـ ثم تحقق أن $-2.2 < \alpha < -2.1$

ب/ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \frac{1 - xe^x}{e^x + 1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1) أ/ احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} [f(x)]$ ثم فسر النتيجة هندسيا.

ب/ بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{e^{-x} - x}{e^{-x} + 1}$$

ثم احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x)]$.

2) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{-g(x)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

3) ادرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها .

4) أ/ بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x$ مقارب مائل لـ (C_f) .

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f) .

5) أ/ بيّن أن: $f(\alpha) = -(\alpha + 1)$ ، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

ب/ بيّن أنّ المنحني (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β حيث: $0.5 < \beta < 0.6$.

6) مثّل بيانيا المستقيم (Δ) والمنحني (C_f) .

7) ليكن m عدد حقيقي موجب تماما، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد واشارة حلول المعادلة:

$$1 - (x + \ln x)e^x - \ln m = 0$$

المسألة الشاملة رقم: 11

مشاهدة الحل

(I) لتكن g دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ وتحقق العلاقة:

$$g(x) - 2g(1-x) = e^x - 2e^{1-x} - 3x + 3$$

1) أوجد عبارة $g(x)$ بدلالة x . (ارشاد: ضع $t = x$ تارة و $t = 1 - x$ تارة أخرى)

2) نضع: $g(x) = e^x - x - 1$ حيث: $D_g = \mathbb{R}$

أ/ احسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها.

ب/ ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.

3) استنتج اتجاه تغير الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

$$h(x) = 1 - g(-x)$$

4) اثبت أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلين α و β حيث:

$$-1.15 < \alpha < -1.14 \quad \text{وَ} \quad 1.84 < \beta < 1.85$$

5) استنتج إشارة كل من $g(x)$ و $h(x)$ تبعا لقيم العدد الحقيقي x .

(II) لتكن f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \frac{x + g(x)}{1 + g(x)}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o; \vec{i}, \vec{j})$.

1) احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2) أ/ اثبت أن الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ وأن:

$$f'(x) = \frac{e^x h(x)}{\left(1 + g(x)\right)^2}$$

ب/ استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3) مثل بيانيا (C_f) .

المسألة الشاملة رقم: 12

مشاهدة الحل

لتكن الدالة f بـ:

$$f(x)=\frac{e^x}{e^x+1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1) عين مجوعة تعريف الدالة f .

2) أ/ احسب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$. ثم فسر النتيجة هندسيا .

ب/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x :

$$f(x)=\frac{1}{e^{-x}+1}$$

ج/ احسب $\lim\limits_{x\to+\infty}[x]$. ثم فسر النتيجة هندسيا .

3) اثبت أن الدالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها .

4) بين أن النقطة $A\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر المنحني (C_f)

5) عين معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة A .

6) نعتبر الدالة g المعرفة على D_f كما يلي:

$$g(x)=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}-f(x)$$

أ/ حلل العبارة: $e^{2x}-2e^x+1$.

ب/ احسب $g'(x)$ و $g(0)$ ثم ادرس تغيرات الدالة g

ج/ استنتج الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمماس (T) .

7) مثل بيانيا (T) و (C_f) .

2

حلول المسائل الشاملة

- حل المسألة الشاملة رقم 01
- حل المسألة الشاملة رقم 02
- حل المسألة الشاملة رقم 03
- حل المسألة الشاملة رقم 04
- حل المسألة الشاملة رقم 05
- حل المسألة الشاملة رقم 06
- حل المسألة الشاملة رقم 07
- حل المسألة الشاملة رقم 08
- حل المسألة الشاملة رقم 09
- حل المسألة الشاملة رقم 10
- حل المسألة الشاملة رقم 11
- حل المسألة الشاملة رقم 12

◄ بالتوفيق في شهادة البكالوريا ►

01 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) دراسة تغيرات الدالة g :

- حساب النهايات:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[x-e^{-x}] = \lim\limits_{x\to-\infty}\left[e^{-x}\left(\frac{x}{e^{-x}}-1\right)\right] = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[x-e^{-x}] = +\infty$

- حساب $g'(x)$:

$$g'(x) = 1 + e^{-x}$$

لدينا $g'(x) > 0$ ومنه:

- جدول التغيرات :

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2) أ- تبيين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α حيث: $0.5 < \alpha < 0.6$:

لدينا الدالة g مستمرة ومتزايدة على $\mathbb{R}$

ولدينا $g(0.6) = 0.05$ و $g(0.5) = -0.1$ ولدينا $g(0.6) \times g(0.5) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا α

ب- استنتاج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II)

1) حساب النهايات:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}\left[\frac{x+1}{e^x+1}\right] = -\infty$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x+1}{e^x+1}\right]$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\frac{x}{e^x}+\frac{1}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}}\right]$$

$$= 0$$

لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{e^x}\right] = 0$

- التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 0$

2) أ- حساب $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{e^x + 1 - e^x(x+1)}{(e^x+1)^2}$$

$$= \frac{e^x + 1 - xe^x - e^x}{(e^x+1)^2}$$

$$= \frac{e^x + 1 - xe^x - e^x}{(e^x+1)^2}$$

$$= \frac{-e^x\,(-e^{-x} + x)}{(e^x+1)^2}$$

$$\frac{-e^x\, g(x)}{(e^x+1)^2}$$

ب- تعيين دون حساب قيمة $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$:

لدينا مما سبق $g(\alpha) = 0$ ومنه :

$$\lim_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right] = f'(\alpha)$$

$$= \frac{-e^\alpha g(\alpha)}{(e^\alpha+1)^2}$$

$$= 0$$

- تفسير الهندسي:

منحني الدالة f يقبل مماس في النقطة ذات الفاصلة α موازٍ لحامل محور الفواصل معادلته هي:

$$y = f(\alpha)$$

3) جدول تغيرات الدالة f :

لدينا:

$$f'(x) = \frac{-e^x g(x)}{(e^x+1)^2}$$

لدينا المقام

- جدول التغيرات:

لدينا $f(-1)=0$ ومنه:

x	$-\infty$		-1		α		$+\infty$
$-e^x$	$-$		$-$		$-$		
$g(x)$	$-$		$-$	0	$+$		
$f'(x)$	$+$		$+$	0	$-$		
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0

4) تبيين أن المعادلة $f(x)=x$ إذا وفقط إذا كان $g(x)=0$:

لتبيين أن $f(x)=x$


يكفي أن نثبت أن: $f(x)-x=0$

$$\begin{aligned} f(x)-x &= \frac{x+1}{e^x+1}-x \\ &= \frac{x+1-e^x-1}{e^x+1} \\ &= \frac{-(e^x-x)}{e^x+1} \\ &= \frac{-g(x)}{e^x+1} \\ &= \frac{0}{e^x+1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

استنتاج قيمة $f(\alpha)$:

لدينا $f(x)=x$ ومنه $f(\alpha)=\alpha$

5) التمثيل البياني:




(III)

1) كتابة $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة:

$$h(x) = |f(x)|$$
$$= \left|\frac{x+1}{e^x+1}\right|$$
$$= \frac{|x+1|}{e^x+1}$$
$$= \begin{cases} \frac{x+1}{e^x+1}; x \geq -1 \\ \frac{-x-1}{e^x+1}; x \leq -1 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} f(x); x \geq -1 \\ -f(x); x \leq -1 \end{cases}$$

2) تمثيل (C_h) :

(C_h) ينطبق على (C_f) لما $f(x) \geq 0$ ويناظر (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل (xx') إذا كان $f(x) \leq 0$


(C_h)
(C_f)
3
2
1
0
−1
−2
−3
−5
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4
5

02 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) حساب النهايات :

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}\right]=-\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x+2-\dfrac{4e^x}{e^x+3}\right]$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{xe^x-2e^x+3x+6}{e^x+3}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e^x\left(x-2+\frac{3x+6}{e^x}\right)}{e^x\left(1+\frac{3}{e^x}\right)}\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x-2+\frac{3x+6}{e^x}}{1+\frac{3}{e^x}}\right]=+\infty$$

2) تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$ فإن : $f'(x)=\left(\frac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$:

$$f'(x)=1-\frac{4e^x(e^x+3)-e^x(4e^x)}{(e^x+3)^2}$$

$$=\frac{(e^x+3)^2+12e^x}{(e^x+3)^2}$$

$$=\frac{e^{2x}-6e^x+9}{(e^x+3)^2}$$

$$=\frac{e^{2x}-6e^x+9}{(e^x+3)^2}$$

$$=\frac{(e^x-3)^2}{(e^x+3)^2}$$

$$=\left(\frac{e^x-3}{e^x+3}\right)^2$$

3) أ/ دراسة اتجاه تغير الدالة f ثم تشكيل جدول تغيراتها:

لدينا $f'(x)\geq 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما

ولدينا

$$e^x - 3 = 0 \Rightarrow e^x = 3$$
$$\Rightarrow x = \ln 3$$

ومنه $f'(x)$ تنعدم عند $\ln 3$ ولا تغير اشارتها

ومنه

x	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

ب/ تعيين $f''(\ln 3)$ دون حساب عبارة $f''(x)$:

عندما تنعدم المشتقة الاولى ولا تغير من اشارتها فإنه توجد نقطة انعطاف وعندها تنعدم المشتقة الثانية

ومنه $f''(\ln 3) = 0$

4) أ/ تبين أن المستقيم (Δ_1) ذو المعادلة $y_1 = x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $-\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x) - y_1] = \lim_{x\to-\infty}\left[x - 2 - \frac{4e^x}{e^x+3} - x + 2\right]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\left[-\frac{4e^x}{e^x+3}\right]$$
$$= 0$$

ومنه المستقيم (Δ_1) مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $-\infty$

ب/ تبين أن المستقيم (Δ_2) ذو المعادلة $y_2 = x - 2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - y_2] = \lim_{x\to+\infty}\left[x + 2 - \frac{4e^x}{e^x+3} - x + 2\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[4 - \frac{4e^x}{e^x+3}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{12}{e^x+3}\right]$$
$$= 0$$

ومنه المستقيم (Δ_2) مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$

5) دراسة الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيمين (Δ_1) و (Δ_2) :

- الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (Δ_1) :

ندرس إشارة الفرق $[f(x) - y_1]$: لدينا:

$$f(x) - y_1 = \frac{-4e^x}{e^x+3}$$

لدينا المقام موجب ومنه الإشارة من إشارة $(-4e^x)$

x	$-\infty$ $+\infty$
$f(x)-y_1$	$-$
الوضعية	(Δ) تحت (C_f)

- الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ_2) :

ندرس إشارة الفرق $[f(x)-y_2]$: لدينا:

$$f(x)-y_2 = 4-\frac{4e^x}{e^x+3} = \frac{12}{e^x+3} > 0$$

ومنه

x	$-\infty$ $+\infty$
$f(x)-y$	$+$
الوضعية	(Δ) فوق (C_f)

6) كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 :

$$(T): y = f'(0)(x-0)+f(0)$$
$$= \left(\frac{e^0-3}{e^0+3}\right)^2 (x)+0+2-\frac{4e^0}{e^0+3}$$
$$= \frac{1}{2}x+1$$

7) تبيين أن النقطة $A(\ln 3\,;\ln 3)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) :



نقول أن النقطة $\Omega(\alpha;\beta)$ مركز تناظر (C_f) إذا تحقق ما يلي:

$$\begin{cases} (2\alpha-x)\in D_f \\ f(2\alpha-x)+f(x)=2\beta \end{cases}$$

أو

$$\begin{cases} (\alpha+x)\in D_f \\ (\alpha-x)\in D_f \\ f(\alpha+x)+f(\alpha-x)=2\beta \end{cases}$$

- نبين أن $(\ln 3+x)\in D_f$ و $(\ln 3-x)\in D_f$:

لدينا: $x\in D_f$ معناه $x\in]-\infty;+\infty[$

ومنه $(\ln 3+x)\in]-\infty;+\infty[$ و $(\ln 3-x)\in]-\infty;+\infty[$

- نبين أن $f(\ln 3+x)+f(\ln 3-x)=2\ln 3$

$$f(\ln 3+x)+f(\ln 3-x)=\left(\ln 3+x+2-\frac{4e^{\ln 3+x}}{e^{\ln 3+x}+3}\right)+\left(\ln 3-x+2-\frac{4e^{\ln 3-x}}{e^{\ln 3-x}+3}\right)$$
$$=2\ln 3+4-\left(\frac{4e^{\ln 3+x}}{e^{\ln 3+x}+3}+\frac{4e^{\ln 3-x}}{e^{\ln 3-x}+3}\right)$$
$$=2\ln 3+4-\left(\frac{12e^{x}}{3e^{x}+3}+\frac{12e^{-x}}{3e^{-x}+3}\right)$$
$$=2\ln 3+4-\left(\frac{4e^{x}}{e^{x}+1}+\frac{4e^{-x}}{e^{-x}+1}\right)$$
$$=2\ln 3+4-\left(\frac{4+4e^{x}+4+4e^{-x}}{1+e^{x}+e^{-x}+1}\right)$$
$$=2\ln 3+4-\left(\frac{8}{2}\right)$$
$$=2\ln 3$$

8) تبين أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$

ولدينا $f(-1)=0.56$ و $f(-2)=-0.17$ ولدينا $f(-1)\times f(-2)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبلا حلا وحيدا α في المجال $]-2;-1[$


- حصر α :

α	-2	-1.9	-1.8	-1.7	...	-1
$f(\alpha)$	-0.17	-0.09	-0.09	0.07	...	0.56

9) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة المائلة : $y=x+2$ و $y=x-2$
- نعين نقطة مركز تناظر المنحني (C_f)
- نرسم المماس (T)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



10)المناقشة البيانية:

$$f(-|x|) = \ln(|m|)x + 2$$

نضع $h(x) = f(-|x|)$

ومنه:


$$h(x) = \begin{cases} f(-(x)); x \geq 0 \\ f(-(-x)); x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} f(-x); x \geq 0 \\ f(x); x \leq 0 \end{cases}$$

لما $x \leq 0$ المنحني (C_h) ينطبق على (C_f) .

لما $x \geq 0$ المنحني (C_h) يناظر المنحني العكسي لـ (C_f) بالنسبة لمحور التراتيب.

ومنه تمثيل (C_h) كالآتي:

المنحني (C_f) و المنحني (C_h) و المستقيم $y = \ln|m|\, x$



ومنه المناقشة كالآتي:

لما: $\ln|m| \leq 1$ أي: $|m| \leq e$ أي: $-e \leq m \leq e$ أي لما: $m \in [-e; e]$ المعادلة لا تقبل حلول

لما: $\ln|m| > 1$ أي: $|m| > e$ أي: $m \in]-\infty; e[\cup]e; +\infty[$ المعادلة تقبل حل وحيدا

(II)

1) دراسة تغيرات الدالة g .

نلاحظ أنّ $g(x) = (f \circ k)(x)$ حيث $k(x) = 3x - 2$

2) التحقق من أن $g\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) = 0$:

$$g\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) = f\left(3\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) - 2\right) = f(\alpha) = 0$$

- تبيين أن $g'\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) = 3f'(\alpha)$:

لدينا: $g'(x) = 3f'(3x-2)$ ومنه:

$$g'\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) = 3f'\left(3\left(\frac{\alpha+2}{3}\right) - 2\right) = 3f'(\alpha)$$

3) استنتاج معادلة المماس (d) لمنحني الدالة g عند النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha+2}{3}$:

$$(d): y = g'\left(\frac{\alpha+2}{3}\right)\left(x - \frac{\alpha+2}{3}\right) + g\left(\frac{\alpha+2}{3}\right)$$
$$= 3f'(\alpha)\left(x - \frac{\alpha+2}{3}\right) + 0$$
$$= 3f'(\alpha)x - f'(\alpha)(\alpha+2)$$

4) التحقق من معادلة المماس (d) :

لدينا:

$$f(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha + 2 - \frac{4e^{\alpha}}{e^{\alpha}+3} = 0$$
$$\Rightarrow \alpha + 2 = \frac{4e^{\alpha}}{e^{\alpha}+3}$$
$$\Rightarrow (\alpha+2)(e^{\alpha}+3) - 4e^{\alpha} = 0$$
$$\Rightarrow ae^{\alpha} + 3a + 2e^{\alpha} + 6 - 4e^{\alpha} = 0$$
$$\Rightarrow e^{\alpha}(a-2) = -(3a+6)$$
$$\Rightarrow e^{\alpha} = \frac{3\alpha+6}{2-\alpha}$$

ولدينا:

$$(d): y = 3f'(\alpha)\left(x - \frac{\alpha+2}{3}\right)$$
$$= 3\left(\frac{e^{\alpha}-3}{e^{\alpha}+3}\right)^2\left(x - \frac{\alpha+2}{3}\right)$$
$$= 3\left(\frac{\frac{3\alpha+6}{2-\alpha} - 3}{\frac{3\alpha+6}{2-\alpha} + 3}\right)^2\left(x - \frac{\alpha+2}{3}\right)$$
$$= 3\left(\frac{\alpha}{2}\right)^2\left(x - \frac{\alpha+2}{3}\right)$$
$$= \frac{3\alpha^2}{4}x - \frac{\alpha^2(\alpha+2)}{4}$$

03 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) من البيان نجد:

أ/

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)]=-1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]=+\infty$

ب-

- $g(0)=-2$
- $g'(0)=0$

2) ايجاد a ، b و c :

لدينا:

$$\begin{cases} g(0)=-2 \\ g'(0)=0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)]=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (a(0)+b)e^0+c=-2 \\ (a(0)+a+b)e^0=0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty}[(ax+b)e^x+c]=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b+c=-2 \\ a+b=0 \\ c=-1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ c=-1 \end{cases}$$

3) أ/ تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α :

لدينا الدالة g مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$

ولدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)]\times\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)]<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α .

- التحقق من أن $1.2<\alpha<1.3$:

لدينا: $g(1.3)=0.1$ و $g(1.2)=-0.3$

ولدينا: $g(1.3)\times g(1.2)<0$

ومنه: $1.2<\alpha<1.3$.

ب/ استنتاج إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II)

1) أ- حساب $\lim[f(x)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{e^x+1}\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\frac{x}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}}\right] = 0$$

لأن: $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{e^x}\right] = 0$ (نهاية شهيرة)

- التفسير الهندسي: المنحني (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y = 0$

ب/ حساب $\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{x}{e^x+1}\right]$:

$$\lim_{x\to-\infty}\left[\frac{x}{e^x+1}\right] = -\infty$$

2) أ/ تبيين أنه من اجل كل x حقيقي: $f'(x) = -\frac{g(x)}{(e^x+1)^2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{e^x+1-xe^x}{(e^x+1)^2} \\ &= \frac{(1-x)e^x+1}{(e^x+1)^2} \\ &= \frac{-\big((x-1)e^x-1\big)}{(e^x+1)^2} \\ &= \frac{-g(x)}{(e^x+1)^2} \end{aligned}$$

ب/ دراسة اتجاه تغير الدالة f :

لدينا $f(0) = 0$

ولدينا: $f'(x) = \frac{-g(x)}{(e^x+1)^2} < 0$ ومنه إشارة المشتقة عكس إشارة $g(x)$.

ومنه جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$	0		$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0

3) تعيين $\lim_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$ دون حساب:

$$\lim_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right] = f'(\alpha) = \frac{-g(\alpha)}{(e^\alpha+1)^2} = 0$$

- تفسير الهندسي:

المنحني (C_f) يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة α موازٍ لحامل محور الفواصل.

4) تبيين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يمر من المبدأ:

لدينا معادلة المماس تكتب من الشكل:

$$y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

يوجد مماس يمر من $O(0;0)$ معناه:

$$\begin{aligned} f'(a)(0-a) + f(a) = 0 \\ \Rightarrow -af'(a)x + f(a) = 0 \\ \Rightarrow a\frac{(a-1)e^a - 1}{(e^a+1)^2} + \frac{a}{e^a+1} = 0 \\ \Rightarrow a(a-1)e^a - a + a(e^a+1) = 0 \\ \Rightarrow a^2e^a = 0 \\ \Rightarrow a = 0 \end{aligned}$$

ومنه معادلة المماس هي:

$$\begin{aligned} (T): y &= f'(0)(x-0) + f(0) \\ y &= \frac{-g(0)}{(e^0+1)^2}x + \frac{0}{e^0+1} \\ y &= \frac{1}{2}x \end{aligned}$$

5) تبيين أن $f(\alpha) = \alpha - 1$:

مما سبق لدينا

$$\begin{aligned} g(\alpha) = 0 \Rightarrow (\alpha-1)e^\alpha - 1 = 0 \\ \Rightarrow (\alpha-1)e^\alpha = 1 \\ \Rightarrow e^\alpha = \frac{1}{\alpha-1} \end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \frac{\alpha}{e^\alpha+1} \\ &= \frac{\alpha}{\frac{1}{\alpha-1}+1} \\ &= \frac{\alpha(\alpha-1)}{\alpha} \\ &= \alpha - 1 \end{aligned}$$

- حصر $f(\alpha)$:

لدينا:

$$\begin{aligned} 1.2 < \alpha < 1.3 \\ 0.2 < a - 1 < 0.3 \\ 0.2 < f(\alpha) < 0.3 \end{aligned}$$

6) أ/ تبيين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$:

لدينا:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-y] = \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{x}{e^x+1}-x\right]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{x-xe^x-x}{e^x+1}\right]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{-xe^x}{e^x+1}\right] = 0$$

لأن: $\lim_{x\to-\infty}[xe^x] = 0$ (نهاية شهيرة)

ب/ دراسة وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) :

دراسة إشارة الفرق: $[f(x)-y]$:

$$f(x)-y = \frac{x}{e^x+1}-x$$
$$= \frac{x-xe^x-x}{e^x+1}$$
$$= \frac{-xe^x}{e^x+1}$$

لدينا $(e^x+1) > 0$ و $e^x > 0$ ومنه الإشارة من إشارة $(-x)$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	0	$-$


الوضعية:

- (C_f) فوق (Δ) في المجال: $]-\infty;0[$
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة 0
- (C_f) تحت (Δ) في المجال: $]0;+\infty[$

7) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيم المقارب $y = 0$ و المستقيم المقارب المائل (Δ)
- نرسم المماس (T)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



8) المناقشة البيانية:

لما $m < 0$ المعادلة تقبل حل وحيد سالب

لما $m = 0$ المعادلة تقبل حل وحيد معدوم

لما $0 < m < \alpha$ المعادلة تقبل حلين موجبين

لما $m = \alpha$ المعادلة تقبل حل مضاعف موجب

لما $m > \alpha$ المعادلة لا تقبل حلولا

04 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) أ/ تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$

$$f'(x) = 1 - \frac{4e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^{2x}+1+2e^x-4e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^{2x}+1-2e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{(e^x-1)^2}{(e^x+1)^2}$$
$$= \left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$$

ب/ دراسة إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

لدينا $f'(x) > 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما.

لدينا $f'(0) = 0$ أي المشتقة تنعدم ولا تغير اشارتها

ومنه نستنتج أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف.

ج/ جدول تغيرات الدالة f :

- حساب النهايات:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}\left[x-1+\frac{4}{e^x+1}\right]$
$= -\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-1+\frac{4}{e^x+1}\right]$
$= \lim\limits_{x\to+\infty}\left[x-1+\frac{\frac{4}{e^x}}{1+\frac{1}{e^x}}\right]$
$= +\infty$

- جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↗	$+\infty$

2) برهان أن النقطة $A(0;1)$ مركز تناظر المنحني (C_f) :

◄ شاهد هذا التذكير ►
(اثبات ان نقطة مركز تناظر)

- نثبت أن: $(2(0)-x) \in D_f$:

لدينا $x \in \mathbb{R}$ ومنه $(-x) \in \mathbb{R}$

- نثبت أن : $f(2(0)-x)+f(x)=2(1)$:

لدينا:

$$f(2(0)-x)+f(x) = -x-1+\frac{4}{e^{-x}+1}+x-1+\frac{4}{e^{x}+1}$$
$$= -2+\frac{4}{e^{-x}+1}+\frac{4}{e^{x}+1}$$
$$= \frac{-2(e^{-x}+1)(e^{x}+1)+4(e^{x}+1)+4(e^{-x}+1)}{(e^{-x}+1)(e^{x}+1)}$$
$$= \frac{2[2(e^{x}+1)+2(e^{-x}+1)-(e^{-x}+1)(e^{x}+1)]}{(e^{-x}+1)(e^{x}+1)}$$
$$= \frac{2[2(e^{x}+e^{-x}+2)-(e^{x}+e^{-x}+2)]}{(e^{-x}+1)(e^{x}+1)}$$
$$= \frac{2[2(e^{x}+e^{-x}+2)-(e^{x}+e^{-x}+2)]}{(e^{-x}+1)(e^{x}+1)}$$
$$= \frac{2[e^{x}+e^{-x}+2]}{(e^{-x}+1)(e^{x}+1)}$$
$$= \frac{2[e^{x}+e^{-x}+2]}{e^{x}+e^{-x}+2}$$
$$= 2$$

ومنه النقطة $A(0;1)$ مركز تناظر المنحني (C_f) .

3) أ/ تبيين أن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]=0$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(x-1)]=\lim_{x\to+\infty}\left[x-1+\frac{4}{e^x+1}-x+1\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{4}{e^x+1}\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{\frac{4}{e^x}}{\frac{1}{e^x}+1}\right]=0$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته: $y=x-1$.

ب/ حساب $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]$:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to-\infty}\left[x-1+\frac{4}{e^x+1}-x\right]$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\left[-1+\frac{4}{e^x+1}\right]$$
$$=3$$

الاستنتاج:

لدينا:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]=3\Rightarrow\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x]-3=0$$
$$\Rightarrow\lim_{x\to-\infty}[f(x)-x-3]=0$$
$$\Rightarrow\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(x+3)]=0$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=x+3$ مقارب مائل بجوار $-\infty$

◄ ملاحظة: أمكننا إدخال 3 داخل النهاية لانها لا تتعلق بالمتغير x ►

4) تبيين أن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α :

لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$

ولدينا: $f(-2.76)=0.001$ و $f(-2.77)=-0.3$


ولدينا: $f(-2.77)\times f(-2.76)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α .

5) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة المائلة : $(y=x-1)$ و $(y=x+3)$
- نعين A نقطة مركز تناظر المنحني (C_f)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



(II)

1) اتجاه تغير الدالة g :

نلاحظ أن $g(x) = (f \circ \varphi)(x)$ حيث: $\varphi(x) = 4x + 1$

لدينا الدالة φ متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

والدالة f متزايدة تماما أيضا على $\mathbb{R}$ (لهما نفس اتجاه التغير)

ومنه الدالة g متزادية تماما على $\mathbb{R}$

2) التحقق من أن: $g\left(\frac{\alpha-1}{4}\right) = 0$

$$g\left(\frac{\alpha-1}{4}\right) = f\left(4\frac{\alpha-1}{4}+1\right)$$
$$= f(\alpha)$$
$$= 0$$

تبيين أن: $g'\left(\frac{\alpha-1}{4}\right) = 4f'(\alpha)$:

لدينا: $g'(x) = 4f'(4x+1)$ ومنه :

$$g'\left(\frac{\alpha-1}{4}\right) = 4f'\left(4\frac{\alpha-1}{4}+1\right)$$

f دالة معرفة على مجال I
وg دالة معرفة على المجال (I)
• إذا كانت الدالتين f و g لهما نفس اتجاه التغير فإن: $(f \circ g)$ متزايدة على I
• إذا كانت الدالتين f و g متعاكستان في اتجاه التغير فإن: $(f \circ g)$ متناقصة على I

3) استنتاج معادلة المماس (T) لمنحني الدالة g في النقطة ذات الفاصلة $\frac{\alpha-1}{4}$:

$$(T): y = g'\left(\frac{\alpha-1}{4}\right)\left(x-\frac{\alpha-1}{4}\right)+g\left(\frac{\alpha-1}{4}\right)$$
$$= 4f'(\alpha)\left(x-\frac{\alpha-1}{4}\right)+0$$
$$= 4f'(\alpha)x - f'(\alpha)(\alpha-1)$$

4) التحقق من أن معادلة المماس (T) تعطى بـ: $y=(\alpha+1)^2x-\frac{(\alpha+1)(\alpha^2-1)}{4}$:

لدينا:

$$f(\alpha)=0 \Rightarrow \alpha-1+\frac{4}{e^\alpha+1}=0$$
$$\Rightarrow \frac{4}{e^\alpha+1}=1-\alpha$$
$$\Rightarrow e^\alpha=\frac{3+\alpha}{1-\alpha}$$

ومنه:

$$(T): y = 4\left(\frac{\frac{3+\alpha}{1-\alpha}-1}{\frac{3+\alpha}{1-\alpha}+1}\right)^2\left(x-\frac{\alpha-1}{4}\right)$$
$$= 4\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)^2\left(x-\frac{\alpha-1}{4}\right)$$
$$= (\alpha+1)^2x-\frac{(\alpha+1)^2(\alpha-1)}{4}$$
$$= (\alpha+1)^2x-\frac{(\alpha+1)(\alpha+1)(\alpha-1)}{4}$$
$$= (\alpha+1)^2x-\frac{(\alpha+1)(\alpha^2-1)}{4}$$

(III)

1) تبيين أن الدالة k زوجية :



دراسة شفعية دالة (زوجية / فردية):

لتبيين أنّ الدالة f فردية نبين أنّ $\begin{cases}(-x)\in D_f\\ f(-x)=-f(x)\end{cases}$

لتبيين أنّ الدالة f زوجية نبين أنّ $\begin{cases}(-x)\in D_f\\ f(-x)=f(x)\end{cases}$

لدينا $(-x) \in \mathbb{R}$

ولدينا:

$$k(-x) = f(|-x|) = f(|x|) = h(x)$$


ومنه الدالة k زوجية.

2) أ/ تبيين كيفية تمثيل (C_k) انطلاقا من (C_f) :

لمّا $x \geq 0$: (C_k) ينطبق على (C_f)

ولما $x \leq$: (C_k) يناظر (C_f) بالنسبة لحامل محور التراتيب (yy')

ب/ التمثيل البياني لـ (C_k) :



(IV)

1) التحقق من أنه كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) + 1$:


$$f(x) + 1 = x - 1 + \frac{4}{e^x + 1} + 1$$
$$= x + \frac{4}{e^x + 1}$$
$$= h(x)$$

2) أ/ استنتاج أن (C) هو صورة (C) بتحويل نقطي بسيط يُطلب تعيينه:

لدينا: $h(x) = f(x) + 1$

ومنه (C_h) هو صورة (C_f) بواسطة انسحاب شعاعه $\vec{u}$ حيث: $\vec{u}(0;1)$

ب/ التمثيل البياني لـ (C_h) :



05 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) دراسة تغيرات الدالة g :

- **النهايات:**

$$\bullet \lim_{x\to-\infty}[g(x)] = \lim_{x\to-\infty}[x+2-e^x]$$
$$= -\infty$$
$$\bullet \lim_{x\to+\infty}[g(x)] = \lim_{x\to+\infty}[x+2-e\hat{}x\,]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[e^x\left(\frac{x}{e^x}+\frac{2}{e^x}-1\right)\right]$$
$$= -\infty$$

لأن: $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{e^x}\right]=0$ نهاية شهيرة)

- **حساب $g'(x)$:**

$$g'(x) = 1-e^x$$

لدينا:

$$g'(x)=0 \Rightarrow 1-e^x=0$$
$$\Rightarrow e^x = 1$$
$$\Rightarrow x = \ln 1$$
$$\Rightarrow x = 0$$

- **جدول التغيرات:**

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$-\infty$

2) تبيين أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلان α و β :

لدينا الدالة g مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$

ولدينا: $g(1.15) = -0.008$ و $g(1.14) = 0.01$

ولدينا: $g(1.14)\times g(1.15) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد α في المجال $]1.14; 1.15[$:

ولدينا: $g(-1.8) = 0.03$ و $g(-1.9) = -0.04$

ولدينا: $g(-1.9) \times g(-1.8) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيد β في المجال $]-1.9; -1.8[$:

3) استنتاج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		β		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

(II)

1) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]$:

- $$\lim_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{e^x-1}{xe^x+1}\right]$$
$$= -1$$

لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}[xe^x] = 0$ (نهاية شهيرة)

- $$\lim_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e^x-1}{xe^x+1}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1-\frac{1}{e^x}}{x+\frac{1}{e^x}}\right]$$
$$= 0$$

- التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $-\infty$ معادلته: $y = -1$.
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي بجوار $+\infty$ معادلته: $y = 0$.

2) تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$:

$$f'(x) = \frac{e^x(xe^x+1) - (e^x+xe^x)(e^x-1)}{(xe^x+1)^2}$$
$$= \frac{xe^{2x} + e^x - e^{2x} + e^x - xe^{2x} + xe^x}{(xe^x+1)^2}$$
$$= \frac{-e^{2x} + 2e^x + xe^x}{(xe^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^x(x+2-e^x)}{(xe^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^x g(x)}{(xe^x+1)^2}$$

3) دراسة اتجاه تغير الدالة f :

لدينا $e^x > 0$ و $(xe^x + 1)^2 > 0$ و منه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

ولدينا : $f(0) = 0$ ومنه جدول التغيرات كالآتي:

x	$-\infty$		β		0		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$+$	
$f(x)$	-1	↘	$f(\beta)$	↗	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0

4) تعيين دون حساب كل من : $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right]$ و $\lim\limits_{x\to\beta}\left[\frac{f(x)-f(\beta)}{x-\beta}\right]$:

- $\lim\limits_{x\to\alpha}\left[\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right] = f'(\alpha) = 0$
- $\lim\limits_{x\to\beta}\left[\dfrac{f(x)-f(\beta)}{x-\beta}\right] = f'(\beta) = 0$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مماسين موازيين لحامل محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين α و β .

5) تبيين أنّ: $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha+1}$:

لدينا:

$$g(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha + 2 - e^{\alpha}$$
$$\Rightarrow e^{\alpha} = \alpha + 2$$

ومنه:

$$f(\alpha) = \frac{e^{\alpha} - 1}{\alpha e^{\alpha} + 1}$$
$$= \frac{\alpha + 2 - 1}{\alpha(\alpha + 2) + 1}$$
$$= \frac{\alpha + 1}{\alpha^2 + 2a + 1}$$
$$= \frac{\alpha + 1}{(\alpha + 1)^2}$$
$$= \frac{1}{\alpha + 1}$$

- حصر $f(\alpha)$:

لدينا:

$$1.14 < \alpha < 1.15$$

$$\frac{1}{2.15} < \frac{1}{\alpha+1} < \frac{1}{2.14}$$

ومنه:

$$0.46 < f(\alpha) < 0.46$$

6) تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) \leq 0$:

لدينا $h(0) = 0$

ولدينا:

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[h(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[e^x - xe^x - 1]$
$= \lim\limits_{x\to+\infty}\left[e^x\left(1 - x - \frac{1}{e^x}\right)\right]$
$= -\infty$
- $\lim\limits_{x\to-\infty}[h(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[e^x - xe^x - 1]$
$= -\infty$

ولدينا:

$$h'(x) = -xe^x$$

جدول تغيرات الدالة h :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
$h(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$

من جدول التغيرات نجد أعلى قيمة تأخذها الدالة h هي 0

ومنه $h(x) \leq 0$.

7) التحقق من ان: $p(0) = 0$:

$$p(0) = 1 - 2 + 1 = 0$$

8) أ- تبيين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) عمودي على المستقيم ذو المعادلة $y = -x + 5$:

◄ يتعامد مستقيمان إذا كان جداء ميليهما يساوي -1 ►

ومنه:

$$f'(a) \times -1 = -1 \Rightarrow f'(a) = 1$$
$$\Rightarrow \frac{e^a(a+2-e^a)}{(ae^a+1)^2} = 1$$
$$\Rightarrow e^a(a+2-e^a) = (ae^a+1)^2$$
$$\Rightarrow (ae^a+1)^2 - e^a(a+2-e^a) = 0$$

$$\Rightarrow a^2e^{2a}+1+2ae^a+e^{2a}-2e^a-ae^a=0$$
$$\Rightarrow (a^2+1)e^{2a}+(a-2)e^a+1=0$$
$$\Rightarrow p(a)=0$$
$$\Rightarrow a=0$$

المعادلة تقبل حل، ومنه المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) عمودي على المستقيم ذو المعادلة $y=-x+5$

ب- كتابة معادلة للمماس (T) :

$$(T): y=f'(a)(x-a)+f(a)$$
$$=x+f(0)$$
$$=x$$

ج- دراسة وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمماس (T) :

ندرس إشارة الفرق : $f(x)-y$

$$f(x)-y=\frac{e^x-1}{xe^x+1}-x$$
$$=\frac{e^x-1-x^2e^x-x}{xe^x+1}$$
$$=\frac{e^x(1-x^2)-(1+x)}{xe^x+1}$$
$$=\frac{e^x(1-x)(1+x)-(1+x)}{xe^x+1}$$
$$=\frac{(1+x)(e^x-xe^x-1)}{xe^x+1}$$
$$=\frac{(1+x)h(x)}{xe^x+1}$$

لدينا: $h(x)\leq 0$

ولدينا:

$$1+x=0\Rightarrow x=-1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$1+x$	$-$	0	$+$

- ندرس إشارة (xe^x+1) :

نضع $\varphi(x)=xe^x+1$

$$\varphi'(x)=e^x+xe^x=e^x(1+x)$$

$e^x>0$ ومنه إشارة $\varphi'(x)$ من إشارة $(1+x)$

$$1+x=0\Rightarrow x=-1$$

- جدول تغيرات $\varphi(x)$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$\varphi'(x)$		$-$	0	$+$	
$\varphi(x)$	1	↘	0.6	↗	$+\infty$

من جدول تغيرات $\varphi(x)$ نلاحظ أن $\varphi(x) > 0$ ومنه:

اذن إشارة الفرق $f(x) - y$ كالآتي

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$h(x)$		$-$	‖	$-$	
$1+x$		$-$	0	$+$	
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	

- الوضعية:

- (C_f) فوق (T) لما $x \in]-\infty;-1[$
- (C_f) يقطع (T) في النقطة $A(-1;-1)$
- (C_f) تحت (T) لما $x \in]-1;+\infty[$


- الاستنتاج:

المماس (T) يقطع المنحني (C_f) في النقطة $A(-1;-1)$ معناه توجد نقطة انعطاف

9) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة: $(y=-1)$ و $(y=0)$
- نرسم المماس (T).
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



10) المناقشة البيانية:

$$e^x(1-mx^2)+mx-1=0 \Rightarrow e^x-mx^2e^x+mx-1=0$$
$$\Rightarrow mx(1-xe^x)=1-e^x$$
$$\Rightarrow mx=\frac{1-e^x}{1-xe^x}$$
$$\Rightarrow \frac{e^x-1}{xe^x-1}=mx$$
$$\Rightarrow f(x)=mx$$

مجموعة حلول المعادلة هي نقط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة : $f(x)=mx$

ومنه:

لما $m=1$ المعادلة تقبل حلا مضاعفا $x=0$ وحلا سالبا

لما $0<m<1$ المعادلة تقبل ثلاث حلول

لما $m\leq 0$ المعادلة تقبل حلا معدوما

لما $m>1$ المعادلة تقبل حلا معدوما

06 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

1) دراسة تغيرات الدالة f' :

لدينا:

$$f'(x) = 2 - e^{x-1} - xe^{x-1}$$
$$= 2 - (1+x)e^{x-1}$$

ومنه ندرس تغيرات الدالة f' :

- النهايات:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f'(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[2-(1+x)e^{x-1}]$
$= \lim\limits_{x\to-\infty}[f'(x)]$
$= 2$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f'(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[2-(1+x)e^{x-1}]$
$= \lim\limits_{x\to-\infty}[f'(x)]$
$= -\infty$

- حساب $f''(x)$:

$$f''(x) = -e^{x-1} - (1+x)e^{x-1}$$
$$= -(2+x)e^{x-1}$$

لدينا $e^{x-1} > 0$ ومنه الإشارة من $-(2+x)$:

$$-(2+x) = 0 \Rightarrow x = -2$$

ومنه:

- جدول تغيرات $f'(x)$:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f''(x)$	$+$	0	$-$
$f'(x)$	2	$f'(-2)$	$-\infty$

2) حساب $f'(1)$:

,

- إشارة $f'(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	

3) دراسة تغيرات الدالة f :

- **النهايات:**

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[2x+1-xe^{x-1}]$

$$= -\infty$$

لأن: $\lim\limits_{x\to-\infty}[xe^{x-1}] = 0$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[2x+1-xe^{x-1}]$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[e^{x-1}\left(\frac{2x}{e^{x-1}}+\frac{1}{e^{x-1}}-x\right)\right]$$

$$= -\infty$$

لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{2x}{e^{x-1}}\right] = 0$

- جدول تغيرات $f(x)$:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	$-\infty$

4) أ/ تبيين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 2x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$:

لدينا:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-y] = \lim_{x\to-\infty}[2x+1-xe^{x-1}-2x-1]$$

$$= \lim_{x\to-\infty}[-xe^{x-1}]$$

$$= 0$$

ومنه (Δ) مستقيم مقارب مائل بجوار $-\infty$

ب/ دراسة وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ) :

ندرس إشارة الفرق: $f(x)-y$:

$$f(x)-y = -xe^{x-1}$$

لدينا $e^{x-1} > 0$ ومنه الإشارة من $(-x)$:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)-y$	$+$	0	$-$

- الوضعية:

- (C_f) فوق (Δ) لما : $x<0$.
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الاحداثيات: $(0;1)$
- (C_f) تحت (Δ) لما : $x>0$.

5) أ/ تبيين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) يوازي المستقيم (Δ):

المستقيم (T) يوازي المستقيم (Δ) معناه:

$$\begin{aligned} f'(a)=2 &\Rightarrow 2-(1+a)e^{a-1}=2 \\ &\Rightarrow -(1+a)e^{a-1}=0 \\ &\Rightarrow -(1+a)=0 \\ &\Rightarrow a=-1 \end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{aligned} (T): y &= f'(-1)\big(x-(-1)\big)+f(-1) \\ &= 2x+2+2(-1)+1-(-1)e^{-1-1} \\ &= 2x+1+e^{-2} \end{aligned}$$

إذن معادلة المماس (T) هي :

$$y=2x+1+e^{-2}$$

ب/ تبيين أن المنحني (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتيهما α و β :

لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة على مجال تعريفها

ولدينا: $f(1.9)\times f(2)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة ، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1.9;2[$


ولدينا: $f(-0.6)\times f(-0.5)<$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة ، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β في المجال $]-0.6;-0.5[$

6) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نعين α و β نقط تقاطع المنحني (C_f) مع حامل محور الفواصل.
- نرسم المستقيم المقارب المائل : $(y=2x+1)$.
- نرسم المماس (T) .
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



7) المناقشة البيانية:

لدينا: من المعادلة (E) : $m \in \mathbb{R}_+^*$

حلول المعادلة (E) هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y = 2x + \ln m$

ومنه:

لما	$\ln m < 1$	أي	$m < e$	أي	$m \in]0; e[$	المعادلة تقبل حل وحيد موجب
لما	$\ln m = 1$	أي	$m = e$			المعادلة تقبل حل وحيد معدوم
لما	$1 < \ln m < 1 + e^{-2}$	أي	$e < m < e^{1+e^{-2}}$	أي	$m \in]e; e^{1+e^{-2}}[$	المعادلة تقبل حلين سالبين
لما	$\ln m = 1 + e^{-2}$	أي	$m = e^{1+e^{-2}}$			المعادلة تقبل حل مضاعف
لما	$\ln m > 1 + e^{-2}$	أي	$m > e^{1+e^{-2}}$	أي	$m \in]e^{1+e^{-2}}; +\infty[$	المعادلة لا تقبل حلول

07 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) دراسة تغيرات الدالة g' :

- **النهايات:**

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[(2x+1)e^x - 1] = -1$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[(2x+1)e^x - 1] = +\infty$

- **التفسير الهندسي للنهايات:**

- منحنى الدالة g يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $-\infty$

- **حساب $g'(x)$:**

$$g'(x) = 2e^x + (2x+1)e^x$$
$$= (2x+3)e^x$$

لدينا $e^x > 0$ ومنه إشارة $g'(x)$ من إشارة $(2x+3)$:

$$2x+3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

- **جدول تغيرات $g(x)$:**

x	$-\infty$		$\frac{-3}{2}$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	-1	↘	$f\left(\frac{-3}{2}\right)$	↗	$+\infty$

2) حساب $g(0)$:

$$g(0) = (2(0)+1)e^0 - 1 = 0$$

- **استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:**

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

(II)

1) حساب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[x(e^x-1)^2] = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[x(e^x-1)^2] = +\infty$

2) أ/ تبيين أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحى (C_f) عند $-\infty$:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-y] = \lim_{x\to-\infty}[x(e^x-1)^2-x]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}[xe^{2x}+x-2xe^x-x]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}[xe^x(e^x-2)]$$
$$= 0$$

لأن $\lim_{x\to-\infty}[xe^x] = 0$

ب/ دراسة الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (Δ) :

دراسة إشارة الفرق $(f(x)-y)$:

$$f(x)-y = xe^x(e^x-2)$$
$$\Rightarrow \begin{cases} xe^x = 0 \\ e^x-2=0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ e^x = 2 \end{cases}$$
$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \ln 2 \end{cases}$$

ومنه:

x	$-\infty$		0		$\ln 2$		$+\infty$
xe^x	$-$		0	$+$		$+$	
e^x-2	$-$			$-$	0	$+$	
$f(x)-y$	$+$		0	$-$	0	$+$	

- الوضعية:

- (C_f) فوق (Δ) لما: $x \in]-\infty;0[\cup]\ln 2;+\infty[$.
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطتين $A(0;0)$ و $B(\ln 2;\ln 2)$.
- (C_f) تحت (Δ) لما: $x \in]0;\ln 2[$.

3) أ/ تبيين أنه يوجد من أجل كل عدد حقيقي x $f'(x) = (e^x-1)g(x)$:

$$f'(x) = (e^x-1)^2+2xe^x(e^x-1)$$
$$= (e^x-1)(e^x-1+2xe^x)$$
$$= (e^x-1)(e^x(2x+1)-1)$$
$$= (e^x-1)g(x)$$

ب/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ في إشارة (e^x-1)

$$e^x-1=0 \Rightarrow e^x = 1$$
$$\Rightarrow x = \ln 1$$
$$\Rightarrow x = 0$$

- جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	
e^x-1		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

4) كتابة معادلة ديكارتية للمماس (T) عند المبدأ:

لدينا معادلة المماس تكتب من الشكل:

$$(T): y = f'(a)(x-a)+f(a)$$

المماس يمر من المبدأ معناه:

$$\begin{aligned}
&f'(a)(0-a)+f(a)=0\\
&\Rightarrow -a(e^a-1)g(a)+a(e^a-1)=0\\
&\Rightarrow a(e^a-1)[-g(a)+(e^a-1)]=0\\
&\Rightarrow a(e^a-1)[-(2a+1)e^a+1+e^a-1]=0\\
&\Rightarrow a(e^a-1)[-2ae^a-e^a+1+e^a-1]=0\\
&\Rightarrow -2a^2(e^a-1)e^a=0\\
&\Rightarrow \begin{cases}-2a^2=0\\ e^a-1=0\end{cases}\\
&\Rightarrow \begin{cases}a=0\\ e^a=1\end{cases}\\
&\Rightarrow \begin{cases}a=0\\ a=\ln 1\end{cases}\\
&\Rightarrow a=0
\end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{aligned}
(T): y &= f'(0)x+f(0)\\
y &= 0x+0\\
y &= 0
\end{aligned}$$


ومنه المستقيم ذو المعادلة $y=0$ مماس للمنحني (C_f) .

5) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيم المقارب المائل $(\Delta): (y=x)$.
- نعين A و B نقط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم (Δ).
- نرسم المماس (T) .

- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



6) المناقشة البيانية:

حلول المعادلة $f(x) = mx$ هل فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة: $y_m = mx$

لما $m = 0$ المعادلة تقبل حلا مضاعفا هو $x = 0$

لما $0 < m < 1$ المعادلة تقبل ثلاث حلول

لما $m \geq 0$ المعادلة تقبل حلان: حل موجب وحل معدوم

لما $m < 0$ المعادلة تقبل حلا معدوما

08 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

1) أ/ تبيين أنه من اجل كل x من $\mathbb{R}$: $1-\frac{1}{e^x+1}=\frac{1}{e^{-x}+1}$:

$$1-\frac{1}{e^x+1}=\frac{e^x+1-1}{e^x+1}$$
$$=\frac{e^x}{e^x+1}\times\frac{e^{-x}}{e^{-x}}$$
$$=\frac{1}{1+e^{-x}}$$

ب/ استنتاج أن الدالة f فردية:

$$f(-x)=1+\frac{1}{2}x-\frac{2}{e^{-x}+1}$$
$$=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{e^{-x}+1}-\frac{1}{e^{-x}+1}$$
$$=1+\frac{1}{2}x-1+\frac{1}{e^x+1}-1+\frac{1}{e^x+1}$$
$$=-1+\frac{1}{2}x+\frac{2}{e^x+1}$$
$$=-\left(1-\frac{1}{2}x-\frac{2}{e^x+1}\right)$$
$$=-f(x)$$

إذن الدالة f فردية

2) حساب نهايات الدالة f عند أطرف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[1-\frac{1}{2}x-\frac{2}{e^x+1}\right]=\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=+\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[1-\frac{1}{2}x-\frac{2}{e^x+1}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=-\infty$

3) أ/ تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=-\frac{1}{2}\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2$:

$$f'(x)=-\frac{1}{2}+\frac{2e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$=\frac{-(e^x+1)^2+4e^x}{2(e^x+1)^2}$$
$$=\frac{-e^{2x}-1-2e^x+4e^x}{2(e^x+1)^2}$$

$$= \frac{-e^{2x} - 1 + 2e^x}{2(e^x + 1)^2}$$
$$= \frac{-(e^{2x} + 1 - 2e^x)}{2(e^x + 1)^2}$$
$$= \frac{-(e^x - 1)^2}{2(e^x + 1)^2}$$
$$= -\frac{1}{2}\left(\frac{e^x - 1}{e^x + 1}\right)^2$$

دراسة إشارة $f'(x)$:

لدينا $-\frac{1}{2}\left(\frac{e^x-1}{e^x+1}\right)^2 \leq 0$ ولدينا: $f'(0) = 0$ ومنه:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$-$

ب/ الاستنتاج:

المشتقة الأولى انعدمت ولم تغير اشارتها إذن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف احداثياتها $O(0;0)$

ج/ جدول تغيرات الدالة f :

لدينا: $f(0) = 0$ ومنه:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	0	$-\infty$

4) أ/ تبيين أن : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\right] = 0$:

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x) - \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)\right] = \lim_{x\to+\infty}\left[1 - \frac{1}{2}x - \frac{2}{e^x + 1} + \frac{1}{2}x - 1\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[-\frac{2}{e^x + 1}\right]$$
$$= 0$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته: $y = -\frac{1}{2}x + 1$

ب/ حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x) + \frac{1}{2}x + 1\right]$:

$$\lim_{x\to-\infty}\left[f(x) + \frac{1}{2}x + 1\right] = \lim_{x\to-\infty}\left[1 - \frac{1}{2}x - \frac{2}{e^x + 1} + \frac{1}{2}x + 1\right]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\left[2 - \frac{2}{e^x + 1}\right]$$

$$= 2 - 2 = 0$$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $-\infty$ معادلته: $y = -\frac{1}{2}x - 1$

5) دراسة الوضع النسبي بين المنحني (C_f) والمستقيم (d) ذو المعادلة: $y = -\frac{1}{2}x + 1$:

ندرس إشارة الفرق $f(x) - y$

$$f(x) - y = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{2}{e^x + 1} + \frac{1}{2}x - 1$$
$$= \frac{-2}{e^x + 1}$$


لدينا: $(e^x + 1) > 0$ ومنه :

x	$-\infty$ $+\infty$
$f(x) - y$	$-$
الوضعية	(C_f) تحت (d)

6) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة المائلة : $\left(y = -\frac{1}{2}x - 1\right)$ و $\left(y = -\frac{1}{2}x + 1\right)$
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)


y=-1/2 x-1
(C_f)
y=-1/2 x+1

09 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

1) تبيين أن $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=-\infty$:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[-x+\frac{5}{2}-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)\right]=+\infty$

لأن:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}[x-2]=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}[e^x]=0\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left[-x+\frac{5}{2}\right]=+\infty\end{cases}$$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-x+\frac{5}{2}-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)\right]=-\infty$

لأن:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-x+\frac{5}{2}\right]=-\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}[x-2]=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left[-\frac{1}{2}e^{x-2}\right]=-\infty\end{cases}$$

2) أ/ تبيين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=-x+\frac{5}{2}$ مقارب مائل للمنحني (C_f) .

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-y]=\lim_{x\to-\infty}\left[-x+\frac{5}{2}-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)+x-\frac{5}{2}\right]$$
$$=\lim_{x\to-\infty}\left[-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)\right]=0$$

ومنه المستقيم (Δ) مقارب مائل بجوار $-\infty$.

ب/ حل المعادلة : $e^{x-2}-4=0$:

$$e^{x-2}-4=0\Rightarrow e^{x-2}=4$$
$$\Rightarrow x-2=\ln 4$$
$$\Rightarrow x=\ln 4+2$$

- تبيين أن المنحني (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) على المجال $]-\infty;2+\ln 4[$ وتحته على المجال $]2+\ln 4;+\infty[$:

دراسة إشارة الفرق $(f(x)-y)$:

$$f(x)-y=-x+\frac{5}{2}-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)+x-\frac{5}{2}$$
$$=-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)$$

لدينا $-\frac{1}{2}e^{x-2}<0$ ولدينا:

$$e^{x-2}-4=0\Rightarrow x=\ln 4+2$$

ومنه:

x	$-\infty$		$\ln 4+2$		$+\infty$
$-\frac{1}{2}e^{x-2}$	$-$		$-$		
$e^{x-2}-4$	$-$	0			$+$
$f(x)-y$	$+$	0			$-$

- الوضعية:

- (C_f) فوق (Δ) لما: $x\in\ ]-\infty;2+\ln 4[$
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة ذات الفاصلة $2+\ln 4$
- (C_f) تحت (Δ) لما: $x\in\ ]2+\ln 4\ ;+\infty[$

3) أ/ تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=-(e^{x-2}-1)^2$:

$$f'(x)=-1-\frac{1}{2}e^{x-2}(e^{x-2}-4)-\frac{1}{2}e^{2(x-2)}$$
$$=-\left(1+\frac{1}{2}e^{2(x-2)}-2e^{x-2}+\frac{1}{2}e^{2(x-2)}\right)$$
$$=-\left(1+e^{2(x-2)}-2e^{x-2}\right)$$
$$=-(e^{x-2}-1)^2$$

ب/ جدول تغيرات الدالة f :

لدينا $f'(x)\leq 0$

ولدينا:

$$f'(x)=0\Rightarrow -(e^{x-2}-1)^2=0$$
$$\Rightarrow (e^{x-2}-1)^2=0$$
$$\Rightarrow e^{x-2}-1=0$$
$$\Rightarrow e^{x-2}=1$$
$$\Rightarrow x-2=0$$
$$\Rightarrow x=2$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$ ↘		$-\infty$

4) حساب $f''(x)$:

$$f''(x) = -2e^{x-2}(e^{x-2} - 1)$$

دراسة $f''(x)$:

لدينا $-2e^{x-2} < 0$

ولدينا:

$$e^{x-2} - 1 = 0 \Rightarrow x = 2$$

ومنه:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$-2e^{x-2}$	$-$	0	$-$
$e^{x-2} - 1$	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$+$	0	$-$

المشتقة الثانية انعدمت وغيرت اشارتها معناه أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف فاصلتها 2

5) اثبات أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $2 + \ln 3 < \alpha < 2 + \ln 4$:

لدينا الدالة f رتيبة ومستمرة على مجال تعريفها

ولدينا: $f(2 + \ln 4) = -0.83$ و $f(2 + \ln 3) = 0.93$

ولدينا: $f(2 + \ln 4) \times f(2 + \ln 3 < 0)$


ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال

$]2 + \ln 3 ; 2 + \ln 4[$

6) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد و(C_f) متجانس:

- نرسم المستقيم المقارب المائل (Δ): $\left(y = -\frac{1}{2}x - 1\right)$
- نعين نقطة تقاطع المنحني (C_f) مع المقارب (Δ)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)


(C_f)
(Δ)
A
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) دراسة تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$:

- **النهايات:**

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[e^x + x + 2] = -\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}[e^x + x + 2]$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left[e^x\left(1 + \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x}\right)\right]$$
$$= +\infty$$

- **حساب $g'(x)$:**

$$g'(x) = e^x + 1$$

لدينا: $g'(x) > 0$:

ومنه:

- **جدول تغيرات $g'(x)$:**

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2) أ/ تبيين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $\mathbb{R}$:

لدينا الدالة g مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$

ولدينا $g(-2.2) = -0.08$ و $g(-2.1) = 0.02$

ولدينا: $g(-2.2) \times g(-2.1) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $-2.2 < \alpha < -2.1$

ب/ استنتاج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II)

1) أ/ حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$:

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)] = \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1-xe^x}{e^x+1}\right] = \frac{1}{1} = 1$$

لأن: $\lim_{x\to-\infty}[xe^x] = 0$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = 1$ بجوار $-\infty$.

ب/ تبيين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \frac{e^{-x}-x}{e^{-x}+1}$:

$$f(x) = \frac{1-xe^x}{e^x+1}$$
$$= \frac{e^x\left(\frac{1}{e^x}-x\right)}{e^x\left(1+\frac{1}{e^x}\right)}$$
$$= \frac{\frac{1}{e^x}-x}{\frac{1}{e^x}+1}$$
$$= \frac{e^{-x}-x}{e^{-x}+1}$$

- حساب $\lim_{x\to+\infty}[f(x)]$:

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e^{-x}-x}{e^{-x}+1}\right] = -\infty$$

لأن: $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{e^x}\right] = 0$

2) التحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{-g(x)e^x}{(e^x+1)^2}$:

$$f'(x) = \frac{(-e^x-xe^x)(e^x+1)-e^x(1-xe^x)}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{-e^x(1+x)(e^x+1)-e^x(1-xe^x)}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^x[-(1+x)(e^x+1)-(1-xe^x)]}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^x[-e^x-1-xe^x-x-1+xe^x]}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{-e^x[e^x+x+2]}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{-g(x)e^x}{(e^x+1)^2}$$

3) دراسة تغيرات الدالة f :

لدينا $e^x > 0$ و $(e^x+1)^2 > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $-g(x)$

- جدول تغيرات $f(x)$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	1	$f(\alpha)$	$-\infty$

4) أ/ تبيين أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x$ مقارب مائل لـ (C_f) :

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1-xe^x}{e^x+1}-x\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1-xe^x+xe^x+x}{e^x+1}\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1+x}{e^x+1}\right]$$
$$= 0$$

لأن: $\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{e^x}\right] = 0$

ومنه المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x$ مقارب مائل لـ (C_f)

ب/ ادرس الوضع النسبي بين (Δ) و (C_f) :

- دراسة إشارة الفرق $(f(x)-y)$

$$f(x)-y = \frac{1+x}{e^x+1}$$

لدينا: $(e^x+1) > 0$ ومنه إشارة الفرق من إشارة البسط:

$$1+x = 0 \Rightarrow x = -1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)-y$	$-$	0	$+$

- الوضعية:

- (C_f) تحت (Δ) لما $x \in]-\infty;-1[$.
- (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1;-1)$
- (C_f) فوق (Δ) لما $x \in]-1;+\infty[$.

5) أ/ تبيين أن: $f(\alpha) = -(\alpha+1)$:

لدينا:

$$g(\alpha) = 0 \Rightarrow e^\alpha + \alpha + 2 = 0$$
$$\Rightarrow e^\alpha = -(\alpha+2)$$

ولدينا:

$$f(\alpha) = \frac{1-\alpha e^\alpha}{e^\alpha+1}$$
$$= \frac{1+\alpha(\alpha+2)}{-(\alpha+2)+1}$$

$$= \frac{\alpha^2 + 2a + 1}{-(\alpha + 1)}$$
$$= \frac{(\alpha + 1)^2}{-(\alpha + 1)}$$
$$= -(\alpha + 1)$$

- حصر $f(\alpha)$:

لدينا:

$$-2.2 < \alpha < -2.1$$
$$-1.2 < \alpha + 1 < -1.1$$
$$1.1 < -(\alpha + 1) < 1.2$$

اذن:

$$1.1 < f(\alpha) < 1.2$$

ب/ تبيين أن المنحني (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β حيث: $0.5 < \beta < 0.6$:

لدينا الدالة f مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$

ولدينا $f(0.6) = -0.03$ و $f(0.5) = 0.06$

ولدينا: $f(0.4) \times f(0.6) < 0$


ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبلا حلا وحيدا β في المجال $]0.5; 0.6[$

ومنه المنحني (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة β .

6) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد و(C_f) متجانس:

- نرسم المستقيم المقارب: $(y = -1)$
- نرسم المستقيم المقارب المائل (Δ): $(y = -x)$
- نعين A نقطة تقاطع المنحني (C_f) مع المقارب (Δ)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



7) المناقشة البيانية:

لدينا:

$$\ln m + (x + \ln x)e^x - 1 = 0 \Rightarrow \ln m + xe^x + e^x \ln m - 1 = 0$$
$$\Rightarrow \ln m\,(1 + e^x) = 1 - xe^x$$
$$\Rightarrow \ln m = \frac{1 - xe^x}{1 + e^x}$$
$$\Rightarrow f(x) = \ln m$$

ومنه مجموعة الحلول هي فواصل نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = \ln m$

لما	$\ln m < \frac{1}{2}$	أي	$m < \sqrt{e}$	المعادلة تقبل حل وحيد موجب
لما	$\ln m = \frac{1}{2}$	أي	$m = \sqrt{e}$	المعادلة تقبل حل وحيد معدوم
لما	$\frac{1}{2} < \ln m < 1$	أي	$\sqrt{e} < m < e$	المعادلة تقبل حل وحيد سالب
لما	$1 < \ln m < f(\alpha)$	أي	$e < m < e^{f(\alpha)}$	المعادلة تقبل حلان سالبان
لما	$\ln m = f(\alpha)$	أي	$m = e^{f(\alpha)}$	المعادلة تقبل حل مضاعف سالب
لما	$\ln m > f(\alpha)$	أي	$m > e^{f(\alpha)}$	المعادلة لا تقبل حلول

11 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

(I)

1) ايجاد عبارة $g(x)$ بدلالة x :

نضع: $x = t$ نجد:

$$g(t) - 2g(1-t) = e^t - 2e^{1-t} - 3t + 3$$
$$\Rightarrow -2g(1-t) = -g(t) + e^t - 2e^{1-t} - 3t + 3$$
$$\Rightarrow \boxed{2g(1-t) = g(t) - e^t + 2e^{1-t} + 3t - 3} \dots (1)$$

نضع : $x = 1 - t$ معناه: $t = 1 - x$ ، نجد:

$$g(1-t) - 2g(1-1+t) = e^{1-t} - 2e^{1-1+t} - 3(1-t) + 3$$
$$\Rightarrow g(1-t) - 2g(t) = e^{1-t} - 2e^t + 3t$$
$$\Rightarrow \boxed{2g(1-t) - 4g(t) = 2e^{1-t} - 4e^t + 6t} \dots (2)$$

نعوض المعادلة (1) في المعادلة (2) نجد:

$$g(t) - e^t + 2e^{1-t} + 3t - 3 - 4g(t) = 2e^{1-t} - 4e^t + 6t$$
$$-e^t - 3 = -4e^t$$

$$\Rightarrow -3g(t) = -3e^t + 3t + 3$$
$$\Rightarrow g(t) = e^t - t - 1$$

إذن :

$$g(x) = e^x - x - 1$$

2)

أ/ حساب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[g(x)] = \lim\limits_{x\to-\infty}[e^x - x - 1] = +\infty$
- $\lim\limits_{x\to+\infty}[g(x)] = \lim\limits_{x\to+\infty}\left[e^x\left(1 - \frac{x}{e^x} - \frac{1}{e^x}\right)\right] = +\infty$

ب/ دراسة اتجاه تغير الدالة g :

لدينا:

$$g'(x) = e^x - 1$$

ولدينا:

$$g'(x) = 0 \Rightarrow e^x - 1 = 0$$
$$\Rightarrow e^x = 1$$

ومنه جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

3) استنتج اتجاه تغير الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $h(x) = 1 - g(-x)$

من أجل كل x من $\mathbb{R}$: نضع:

$u(x) = -x$ و $v(x) = g(u(x)) = g(-x)$ أي $v(x) = (g \circ u)(x)$

لدينا الدالة g متناقصة على المجال $\underbrace{]-\infty; 0]}_{\text{المجال } I}$ والدالة u متناقصة على المجال $\underbrace{[0; +\infty[}_{\text{المجال } g(I)}$

كيف وجدنا المجال $g(I)$:

لدينا: $I =]-\infty; 0]$ و $u(x) \in I$ معناه $u(x) \leq 0$ أي $-x \leq 0$ ومنه $x \geq 0$ أي $x \in [0; +\infty[$

ومنه: $g(I) = [0; +\infty[$.

وبما أنّ الدالة g متناقصة على $]-\infty; 0]$ و الدالة u متناقصة على $[0; +\infty[$

إذن الدالة k متزايدة على المجال $[0; +\infty[$

بنفس الفكرة نجد: الدالة k متناقصة على المجال $]-\infty; 0]$

- واضح أن $g(-x) = k(x)$ أي: $-g(-x) = -k(x)$

وعليه:

$-k(x)$ متزايدة على المجال $]-\infty; 0]$ و متناقصة على المجال $[0; +\infty[$

ولدينا $h(x)$ و $-k(x)$ لهما نفس اتجاه التغير لأن: $h(x) = 1 - k(x)$

اذن:

x	$-\infty$		α		0		β		$+\infty$
$f(x)$	0		0	↗	$h(0) = 1$	↘	0		
	$-\infty$								$-\infty$

4) اثبات أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلين α و β:

لدينا الدالة h مستمرة ورتيبة على مجال تعريفها

ولدينا: $h(-1.14) = 0.01$ و $h(-1.15) = -0.08$

ولدينا: $h(-1.14) \times h(-1.15) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1.15;-1.14[$

ولدينا: $h(1.85)=-0.007$ و $h(1.84)=0.001$

ولدينا: $h(1.84)\times h(1.85)<0$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلا وحيدا β في المجال $]1.84;1.85[$

اذن المعادلة $h(x)=0$ تقبل حلين α و β

5) استنتاج إشارة كل من $g(x)$ و $h(x)$ تبعا لقيم العدد الحقيقي x :

إشارة $g(x)$:

من جدول تغيرات $g(x)$ لدينا:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$	$+$		0		$+$

إشارة $h(x)$:

من جدول تغيرات $h(x)$ لدينا:

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$h(x)$	$-$	0		$+$	0	$-$	

(II)

1) حساب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\dfrac{x+g(x)}{1+g(x)}\right]$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\dfrac{x+e^x-x-1}{1+e^x-x-1}\right]$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\dfrac{e^x-1}{e^x-x}\right]$

$=\dfrac{-1}{+\infty}$

$=0$

- $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{x+g(x)}{1+g(x)}\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{e^x-1}{e^x-x}\right]$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\dfrac{1-\frac{1}{e^x}}{1-\frac{x}{e^x}}\right]$

$=1$

لأن: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\frac{x}{e^x}\right]=0$

- التفسير الهندسي:

- (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $-\infty$ معادلته $y=0$.
- (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل بجوار $+\infty$ معادلته $y=1$.

2) أ/ اثبات أن الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$:

$$f(x)=\frac{x+g(x)}{1+g(x)}$$

لدينا البسط عبارة عن مجموعة دالتين قابلتين للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والمقام كذلك

ومنه البسط على المقام قابل للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

اذن الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.

- اثبات أن: $f'(x)=\frac{e^x h(x)}{(1+g(x))^2}$:

لدينا:

$$\begin{aligned}h(x)&=1-g(-x)\\&=1-e^{-x}-x+1\\&=2-x-e^{-x}\end{aligned}$$

ومنه:

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{e^x(e^x-x)-(e^x-1)(e^x-1)}{(e^x-x)^2}\\&=\frac{e^x[e^x-x-(1-e^{-x})(e^x-1)]}{(e^x-x+1-1)^2}\\&=\frac{e^x(e^x-x-e^x+1+1-e^{-x})}{\left(1+g(x)\right)^2}\\&=\frac{e^x(2-x-e^{-x})}{\left(1+g(x)\right)^2}\\&=\frac{e^x h(x)}{\left(1+g(x)\right)^2}\end{aligned}$$

ب/ استنتاج اتجاه تغير الدالة f :

لدينا: $\left(1+g(x)\right)^2>0$ و $e^x>0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $h(x)$.

ولدينا $f(0)=0$


- جدول التغيرات:

x	$-\infty$		α		0		β		$+\infty$
$f'(x)$	$-$		0	$+$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	0	↘	$f(\alpha)$	↗	0	↗	$f(\beta)$	↘	1

3) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة $y = 0$ و $y = 1$
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)



12 حل المسألة الشاملة رقم:

مشاهـــدة المسألة

لتكن الدالة f بـ:

$$f(x)=\frac{e^x}{e^x+1}$$

ونسمي (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(o;\vec{i},\vec{j})$.

1) تعيين مجموعة تعريف الدالة f :

الدالة f معرفة لما : $e^x+1\neq 0$

ولدينا $e^x+1>0$

ومنه الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$

2) أ/ حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]$:

- $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)]=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[\frac{e^x}{e^x+1}\right]$
$=0$

- التفسير الهندسي: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $-\infty$ معادلته $y=0$.

ب/ تبيين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x)=\frac{1}{e^{-x}+1}$

لدينا:

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{e^x}{e^x+1}\\&=\frac{e^x}{e^x\left(1+\frac{1}{e^x}\right)}\\&=\frac{1}{1+e^{-x}}\end{aligned}$$

ج/ حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}[x]$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}[x]&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{e^x}{e^x+1}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{1+e^{-x}}\right]\\&=1\end{aligned}$$

- التفسير الهندسي: (C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي بجوار $+\infty$ معادلته $y=1$.

3) اثبات أن الدالة f متزايدة تماما:

- حساب $f'(x)$:

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x+1) - e^x e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$$

لدينا $g'(x) > 0$ ومنه:

- جدول تغيرات الدالة f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0	1

4) تبيين أن النقطة $A\left(0;\frac{1}{2}\right)$ مركز تناظر المنحني (C_f) :

◄ شاهد هذا التذكير ►
(اثبات ان نقطة مركز تناظر)

- نبيّن أن $(2(0)-x) \in D_f$:

واضح أن $(-x) \in \mathbb{R}$

- نبيّن أن $f(2(0)-x) + f(x) = 2\left(\frac{1}{2}\right)$:

$$f(2(0)-x) + f(x) = \frac{e^x}{e^x+1} + \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$$
$$= \frac{e^x(e^{-x}+1) + e^{-x}(e^x+1)}{(e^x+1)(e^{-x}+1)}$$
$$= \frac{1+e^x+1+e^{-x}}{1+e^x+e^{-x}+1}$$
$$= \frac{2}{2}$$
$$= 2\left(\frac{1}{2}\right)$$

5) تعيين معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة A :

$$(T): y = f'(0)(x-0) + f(0)$$
$$= \frac{e^0}{(e^0+1)^2}x + \frac{e^0}{e^0+1}$$
$$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

6)

أ/ تحليل العبارة: $e^{2x} - 2e^x + 1$:

$$e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x - 1)^2$$

ب/

$$\bullet\ g'(x) = \frac{1}{4} - f'(x)$$
$$= \frac{1}{4} - \frac{e^x}{(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{(e^x+1)^2 - 4e^x}{4(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^{2x} + 1 + 2e^x - 4e^x}{4(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{e^{2x} + 1 - 2e^x}{4(e^x+1)^2}$$
$$= \frac{(e^x-1)^2}{4(e^x+1)^2}$$

ولدينا:

$$\bullet\ g(0) = 0$$

- دراسة تغيرات الدالة g :

حساب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها:

$$\bullet\ \lim_{x\to-\infty}[g(x)] = \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} - f(x)\right]$$
$$= \lim_{x\to-\infty}\left[\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}\right] - \lim_{x\to-\infty}[f(x)]$$
$$= -\infty$$
$$\bullet\ \lim_{x\to+\infty}[g(x)] = \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} - f(x)\right]$$
$$= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}\right] - \lim_{x\to+\infty}[f(x)]$$
$$= +\infty$$

لدينا: $g'(x) \geq 0$

ولدينا:

$$(e^x-1)^2 = 0 \Rightarrow e^x - 1 = 0$$
$$\Rightarrow e^x = 1$$
$$\Rightarrow x = 0$$

ومنه:

- جدول التغيرات:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$	$+$		0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$

ج/ استنتاج الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمماس (T) :

لدينا:

$$g(x) = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2} - f(x)$$
$$\Rightarrow f(x) - \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}\right) = -g(x)$$

ومنه الوضعية من إشارة $-g(x)$:

لدينا من جدول تغيرات الدالة g :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g(x)$	$-$		0	$+$	


- الوضعية:

- (C_f) تحت (T) لما $x \in]-\infty; 0[$.
- (C_f) يقطع (T) في النقطة A .
- (C_f) فوق (T) لما $x \in]0; +\infty[$.

7) التمثيل البياني:

خطوات التمثيل على معلم متعامد ومتجانس:

- نرسم المستقيمات المقاربة $y = 0$ و $y = 1$
- نعين A نقطة تقاطع (C_f) مع (T)
- نرسم المماس (T)
- ثم باستعمال جدول التغيرات نرسم (C_f)


y=1
A
(C_f)
y=0
(T)
O
$\vec{j}$
$\vec{i}$