# سلسلة تمارين

# المرجع

## Le Barycentre

# 2AS

علوم تجريبية+ تقني رياضي+رياضيات

**شكر خاص لأصحاب هذا العمل**

جمعها لكم الأستاذ: شعبان أسامة



التمرين الأول : لتكن A و B نقطتان

1) بين أنه توجد نقطة وحيدة G حيث : $2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ و أرسمها .
لتكن M نقطة كيفية من المستوي أكتب بدلالة الشعاع $\overrightarrow{MG}$ الشعاع $2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$ .
2) نفس السؤال مع $-3\overrightarrow{GA} + 5\overrightarrow{GB} = \vec{0}$
3) لنعتبر عددان حقيقيان $\alpha$ و $\beta$ . هل توجد نقطة وحيدة G حيث : $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

التمرين الثاني :

لتكن A و B نقطتان متمايزتان و M نقطة من المستقيم (AB)

برر وجود عدد حقيقي k حيث $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$ و إستنتج أن M هي مرجح النقطتين A و B المرفقتين بمعاملين $\alpha$ و $\beta$

التمرين الثالث : لتكن A و B نقطتان متمايزتان

عين وأنشئ المرجح $G_1$ للجملة $\{(A,1);(B,3)\}$ ؛ عين وأنشئ المرجح $G_2$ للجملة $\{(A,-1);(B,4)\}$

عين وأنشئ المرجح $G_3$ للجملة $\{(A,2);(B,-3)\}$ ؛ عين وأنشئ المرجح $G_4$ للجملة $\{(A,-4);(B,6)\}$

التمرين الرابع :

في كل من الحالات التالية إعط المعاملات $\alpha$ و $\beta$ حيث M مرجح الجملة $\{(A,\alpha);(B,\beta)\}$

1) $2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ ؛ 2) $\overrightarrow{MA} = 2\overrightarrow{AB}$ ؛ 3) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ؛ 4) $-3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$

التمرين الخامس :

C هو المرجح لـ : (A,3) و (B,-7)

- عين عددان حقيقيان $\beta$ و $\gamma$ حتى يكون A مرجح لـ : (B, $\beta$) و (C, $\gamma$)
- عين عددان حقيقيان $\alpha$ و $\delta$ حتى يكون B مرجح لـ : (A, $\alpha$) و (C, $\delta$)

التمرين السادس :

لتكن G مرجح الجملة المثقلة $\{(A,\alpha);(B,\beta)\}$ حيث $\alpha + \beta \neq 0$

- بين أنه إذا كان $\alpha$ و $\beta$ موجبان فإن G تقع على القطعة [AB]
- أين تكون النقطة G إذا كان $\alpha$ و $\beta$ سالبان .
- أين تكون النقطة G إذا كان $\alpha$ و $\beta$ مختلفان في الإشارة .





التمرين السابع :

ABC مثلث ، D و E نقطتان معرفتان بـ : $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AC}$

الموازي لـ ( AC ) من D يقطع المستقيم ( BC ) في F

1. عبر عن C كمرجح لـ A و E
2. عبر عن E كمرجح لـ A و C
3. عبر عن F كمرجح لـ B و C

التمرين الثامن :

$[AB]$ قطعة مستقيمة طولها L . ندل بـ $\Gamma$ إلى مجموعة النقط M من المستوي حيث $\left\|2\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right\| = L$

و بـ O نظيرة النقطة B بالنسبة إلى A . بين أن $\Gamma$ هي دائرة مركزها O ونصف قطرها L .

التمرين التاسع :

نعتبر نقطتان A و B حيث AB = 8


1. أنشئ G مرجح النقط المثقلة ( A , 5 ) و ( B , 3 )
2. أنشئ H مرجح النقط المثقلة ( A , 11 ) و ( B , -3 )
3. M نقطة من المستوي . برر أن الشعاعين $\vec{U} = 5\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}$ و $\vec{V} = 11\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}$ موازيين لـ $\overrightarrow{MG}$ و $\overrightarrow{MH}$
4. عين المجموعة $E_1$ للنقط M من المستوي و التي تحقق $\left\|5\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\right\| = \left\|11\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}\right\|$

التمرين العاشر :

ليكن ABC مثلث متساوي الساقين في A حيث BC = 8cm و BA = 5cm و ليكن I منتصف [BC]

1. أنشئ النقطة F حيث $\overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{BA}$ و بين أن F هي مرجح النقطتين A و B المرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما
2. لتكن P نقطة من المستوي إختصر كل من المجاميع التالية : $\frac{1}{2}\overrightarrow{PB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$ ؛ $-\overrightarrow{PA} + 2\overrightarrow{PB}$ ؛ $2\overrightarrow{PB} - 2\overrightarrow{PC}$
3. عين ثم أنشئ مجموعة النقط M من المستوي حيث : $\left\|\frac{1}{2}\overrightarrow{MB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{MC}\right\| = \left\|-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\right\|$
4. عين ثم أنشئ مجموعة النقط N من المستوي حيث : $\left\|\overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC}\right\| = \left\|2\overrightarrow{NB} - 2\overrightarrow{NC}\right\|$

**1)** الشكل المقابل $AB$ يمثل قضيب مهمل الكتلة .




نعلق في الطرف $A$ كتلة مقدارها $1kg$ و نعلق في الطرف $B$ كتلة مقدارها $2kg$.

لدينا: $\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GB}=\vec{0}$ ومنه نقول أن النقطة $G$ هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A;...),(B;...)\}$

**2)** في الشكل المقابل نعلق في ا لطرف $A$ كتلة مقدارها $1kg$ بواسطة بكرة كما نعلق في الطرف $B$كتلة مقدارها $2kg$.

لدينا $-\overrightarrow{GA}+2\overrightarrow{GB}=\vec{0}$ ومنه

نقول أن النقطة $G$ هي مرجح الجملة المثقلة $\{(A;...),(B;...)\}$

## تمرين 1

☜ $ABC$ مثلث قائم في $A$ ومتساوي الساقين حيث $AB=4cm$

**1-** أنشئ النقطة $F$ المعرفة بالعلاقة $\overrightarrow{FB}+2\overrightarrow{FC}=\vec{0}$ .

**2-** انشئ النقطة $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;-1),(B;1),(C;2)\}$.

**3-** عين طبيعة وأنشئ $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي بحيث ، $\left\|-\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right\|=4$ .

## تمرين 2

ليكن $ABCD$ مستطيلا .

**1-** أنشئ النقطة $G$ مرجح الجملة $\{(A;2),(B;3)\}$ و النقطة $J$ مرجح الجملة $\{(C;4),(D;1)\}$.

**2-** لتكن النقطة $H$ المعرفة بـ : $2\overrightarrow{HA}+3\overrightarrow{HB}+4\overrightarrow{HC}+\overrightarrow{HD}=\vec{0}$

- بين أن النقط $G,H$ و $J$ في استقامية .

**3-** عين طبيعة $(\Delta)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث ، $\left\|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\right\|=\left\|4\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right\|$

**4-** عين طبيعة $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث ، $\left\|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right\|=20$

## تمرين 3

☜ ليكن $ABC$ مثلث قائم في النقطة $A$ حيث $AB=6cm$ و $AC=3cm$ .

ولتكن $G$ مركز ثقل المثلث $ABC$ و $E$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;1),(B;5),(C;-3)\}$

**1-** أكتب كلا من $\overrightarrow{AG}$ و $\overrightarrow{AE}$ بدلالة $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AC}$.

**2-** بين $(GE)$ يوازي $(CB)$.

**3-** عين طبيعة و أنشئ $(E)$مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث ،

$\left\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right\|=\left\|\overrightarrow{MA}+5\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\right\|$ .

## تمرين 4

☜ في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ . نعتبر النقط $B(0;2), A(-1;1)$ و $C(2;-3)$ ، $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2),(B;-3)\}$ و $H$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2),(B;-3),(C;-1)\}$.

**1-** علم النقط $B, A$ و $C$ .

**2-** أحسب إحداثيات كل من النقطتين $G$ و $H$ ثم بين أن النقطة $H$ هي منتصف القطعة $[CG]$.

**3-** لتكن $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي بحيث يكون : $\left\|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right\|=6$

أ) بين أنه من أجل كل نقطة $M$ من المستوي ، $2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=-2\overrightarrow{MH}$

ب) عين طبيعة المجموعة $(\Gamma)$ ثم أنشئها .

## تمرين 5

☜ في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ . نعتبر النقط $B(3;-1), A(1;1)$ و $C(4;4)$ .

**1)** نعتبر النقطة $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2),(B;m),(C;5)\}$ حيث $m$ عدد حقيقي .

أ) عين قيم $m$ بحيث تكون النقطة $G$ موجودة .

ب) عين قيم $m$ بحيث تكون النقطة $H\left(\frac{11}{5};-\frac{1}{5}\right)$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2),(B;m)\}$.

**2)** نفرض $m=3$

أ) أنشئ النقطة $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2),(B;3),(C;5)\}$.

ب) عين طبيعة و أنشئ $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي بحيث يكون :

$$\left\|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}+5\overrightarrow{MC}\right\|=20$$

## تمرين 6

☜ في المعلم المتعامد و المتجانس $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ نعتبر النقط $C(5;7), B(-1;5), A(2;1)$ و $G\left(1;\frac{5}{2}\right)$.

**1-** عين إحداثيي $I$ مركز المسافتين المتساويتين للنقطتين $B$ و $C$.

**2-** عين إحداثيي النقطة $H$ مركز ثقل المثلث $ABC$.

**3-** هل يوجد عدد حقيقي $m$ بحيث تكون النقطة $G$ مرجحا للجملة $\{(A;1),(B;m)\}$.

✌ بالتوفيق ☺😐🌼 والنجاح ☹

**التمرين الأول :** $A$ ، $B$ نقطتين من المستوي متمايزتين.

• عين مرجه الجملة المثقلة في كل حالة:

$\{(A,4);(B,5)\}$ ، $\{(A,8);(B,-5)\}$ ، $\{(A,4);(B,2)\}$ ، $\{(A,5);(B,5)\}$

$A$ ، $B$ ، $C$ ثلاث نقط من المستوي ليست في إستقامية.

• عين مرجح الجملة المثقلة في كل حالة:

$\{(A,4);(B,6);(C,1)\}$ ، $\{(A,-4);(B,-2);(C,-1)\}$ ، $\{(A,4);(B,0);(C,2)\}$ ، $\{(A,4);(B,4);(C,4)\}$

**التمرين الثاني:** $ABCD$ مربع طول ظلعه $2cm$ .

♦ عين إحداثيات مرجح الجملة المثقلة في كل حالة:

$\{(A,4);(B,6);(C,1)\}$ ، $\{(A,2);(B,-6);(D,1)\}$ ، $\{(D,4);(B,-1);(C,2)\}$

$\{(A,-4);(B,-2);(C,3);(D,1)\}$ ، $\{(A,14);(B,14);(C,14);(D,14)\}$

**التمرين الثالث:**

$ABCD$ رباعي $I$ ، $J$ ، $K$ ، $L$ منتصفا ت الأضلاع $[AB]$ ، $[BC]$ ، $[CD]$ ، $[DA]$ على الترتيب.

$M$ ، $N$ منتصفا القطرين $[AC]$ و $[BD]$ .

■ برهن أن المستقيمات $(MN)$ ، $(JL)$ ، $(IK)$ تتقاطع في نقطة.

**(إرشاد: نعلم أن $O$ مركز ثقل الرباعي)**

**التمرين الرابع :** لتكن القطعة $[AB]$ طولها $5cm$ .

١. ماهي مجموعة النقط $M$ من المستوي بحيث: $AM = 5cm$

٢.عين مجموعة النقط $M$ من المستوي بحيث:

$$||\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}|| = 5cm$$

**التمرين الخامس :** $A$ ، $B$ ، $C$ ثلاث نقط من المستوي ليست في إستقامية.

■ عين مجموعة النقط $M$ من المستوي في كل حالة:

★ $||-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|| = 4$

★ $||-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 3\overrightarrow{MC}|| = 2$

★ $||-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}|| = -\sqrt{2}$

★ $||2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}|| = 0$

$||-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}|| = ||-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}||$

$-\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}||$

★ $||-\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}|| = 2MA$

**التمرين السادس :**

$ABC$ مثلث حيث: $AC = 6$ ؛ $AB = 5$ ؛ $CB = 4$

1. أنشىء $G$ مرجح الجملة $\{(A,1),(B,2),(C,1)\}$ .

2. عين المجموعة $(E_1)$ مجموعة النقط من المستوي حيث:

$$||\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|| = 6$$

3. عين المجموعة $(E_2)$ مجموعة النقط من المستوي حيث:

$$||\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|| = ||3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}||$$

4. نضع $A(1,2)$ ؛ $B(-3,4)$ ؛ $C(0,1)$

عين إحداثيتي $G$ مرجح الجملة $\{(A,1),(B,2),(C,1)\}$

**التمرين السابع :** من بين الأجوبة المقترحة إختر جوابا واحدا صحيحا مع التعليل:

☜ العلاقة الشعاعية التالية: $\overrightarrow{AG} + 2\overrightarrow{GB} - \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{0}$ تعني أن $G$ مرجح الجملة المثقلة: □ $\{(A,1);(B,2);(C,-1)\}$

□ $\{(A,1);(B,2);(C,3)\}$ ، □ $\{(A,-1);(B,2);(C,1)\}$

☜ مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث:

$||\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|| = 6$ هي:

□ دائرة يطلب تعيين عناصرها المميزة

□ محور قطعة مستقيمة يطلب تعيينها.

☜ المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ ولتكن النقط $A(2,-1)$ ، $B(0,3)$ ، $C(-2,1)$ .

١. إحداثيتي مركز ثقل المثلث $ABC$ هي:

□ $(0,1)$ ، □ $(0,3)$ ، □ $(1,0)$ .

٢. إحداثيتي مركز المسافات المتساوية للنقط $A$ ، $B$ ، $C$ هي: □ $(2,1)$ ، □ $(2,3)$ ، □ $(1,1)$ .

☜ مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث:

$||\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|| = ||-\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}||$

هي: □ دائرة يطلب تعيين عناصرها المميزة

□ محور قطعة مستقيمة يطلب تعيينها.

**التمرين الثامن :** $I$• $A$ ، $B$ ، $C$ ثلاث نقط من المستوي ليست على إستقامة واحدة
لتكن الجملة المثقلة $\{(A,\alpha);(B,2\alpha+1)\}$ $(\alpha\in\mathbb{R})$ .
1− عين قيمة العدد $\alpha$ حتى تقبل الجملة السابقة مرجحا.
2− أنشىء $G$ مرجح الجملة السابقة من أجل $\alpha=1$ .
$II$• المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ ولتكن النقط $A(2,3)$ ، $B(1,-3)$ ، $C(3,x)$ حيث $x\in\mathbb{R}$
1) عين قيمة $x$ حتى يكون $ABC$ مثلثا.
2) نضع $x=-3$
أ) أحسب أطوال أضلاع المثلث $ABC$ واستنتج طبيعته.
ب) عين احداثيتي النقطة $G$ .
ج) عين ثم أنشىء مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث:
$$||\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}||=12$$

**التمرين التاسع :**
في المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O,\vec{i},\vec{j})$ نعتبر النقط $A(3,2)$ ، $B(1,-1)$ ، $C(-1,5)$ ، $D(2,5)$ .
1) عين إحداثيتي مركز ثقل المثلث $ABC$ .
2) أثبت أن $D$ هي مرجح الجملة المثقلة
$\{(A,2);(B,-1);(C,1)\}$ .
3) عين مجموعة النقط $M$ من المستوي حيث:
$$||2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}||=||\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MC}||$$
$$||2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}||=||\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}||$$

**التمرين التاسع :** $ABC$ مثلث متساوي الساقين طول ضلعه $a$ ومركز ثقله النقطة $K$ .
لتكن $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A,1);(B,-3);(C,1)\}$ .
١. برر وجود النقطة المثقلة $G$ . ٢. أنشىء $H$ مرجح الجملة المثقلة $\{(A,1);(C,1)\}$ .
٣. بين أن $G$ مرجح الجملة المثقلة $\{(H,2);(B,-3)\}$ .
٤. لتكن $(E)$ مجموعة النقط $M$ من المستوي التي تحقق:
$$||\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}||=||\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}||$$
◦ تحقق أن النقطة $B$ تنتمي للمجموعة $(E)$ .
◦ بين أن الشعاع $\overrightarrow{GM}=a\sqrt{3}$ ثم استنتج طبيعة المجموعة $(E)$ محققا عناصرها المميزة.
◦ لتكن $(E')$ مجموعة النقط $M$ من المستوي التي تحقق:
$$3||\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}||=||\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}||$$
عين طبيعة المجموعة $(E')$ محققا عناصرها المميزة.